


LE SIDA EN CATALOGNE

LA PROPORTION DE MALADES TOXICOMANES EST BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉE EN CATALOGNE QU'AUX USA OU DANS LE RESTE DE L'EUROPE. LA TRANSMISSION DE LA MALADIE A ÉTÉ IMPORTANTE DANS LES GROUPES OÙ LES MESURES DE PRÉVENTION SONT DIFFICILES À APPLIQUER.

ORIOL RAMIS - JUAN LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE



D'après les estimations faites lors de la dernière Conférence Internationale sur le SIDA, qui a eu lieu à Paris en juin dernier, le nombre de personnes déjà affectées dans les pays industrialisés se monte à environ 2.000. En Espagne, l'incidence de cette maladie est bien moindre qu'aux USA, où se concentrent plus de 80 % des cas des pays développés ; mais le nombre des personnes atteintes est en augmentation continuelle partout.

Nous avons heureusement assisté, dans les derniers mois, à d'importants progrès. Des chercheurs français et nord-américains ont découvert le rôle étiologique d'un virus connu comme le H. I. V. (Virus Lié à l'Immuno-déficience humaine). Cela a permis de donner un grand essor à la recherche. Néanmoins, il devra se passer des nombreuses années avant que l'on puisse disposer d'un vaccin efficace. Le temps qui sera nécessaire pour trouver un traitement adéquat est encore plus incertain. En revanche, nous connaissons assez bien les voies de contagion.

Le virus se transmet par transfusion sanguine d'un donneur infecté à un individu récepteur, par voie génitale, ou, pendant la grossesse, de mère à enfant. La première forme de transmission explique le fait que la maladie se présente


souvent chez les hémophiles, qui ont constamment besoin d'apports de sang provenant de dons. La majorité des hémophiles affectés ont reçu des extraits sanguins provenant de dons non contrôlés, lorsque l'on ne connaissait pas encore la nature du syndrome. Maintenant que le rôle du virus est bien établi, et que nous disposons de moyens pour détecter les extraits sanguins infectés, ces cas ne devraient plus se produire. La Catalogne, comme la majorité des pays européens, a établi une législation pour régulariser le contrôle destiné à détecter l'existence de contact avec le virus, aussi bien dans les dons de sang que dans les industries appliquées aux produits sanguins.

Cependant, la majorité des transmissions par voie sanguine se produit chez les toxicomanes par voie intraveineuse, et en particulier chez les héroïnomanes qui se passent les aiguilles et les seringues les uns aux autres. Les résidus de sang qui restent dans les seringues transmettent l'infection.

La contagion par voie sexuelle, dans les pays industrialisés, se limite presque toujours aux rapports homosexuels masculins, probablement à cause de petits traumatismes caractéristiques du coït anal et autres pratiques habituelles de ces rapports. Dans les pays africains

où le nombre de personnes atteintes est probablement beaucoup plus élevé qu'aux USA, la transmission hétérosexuelle est beaucoup plus fréquente, sans que l'on ait trouvé d'explication satisfaisante jusqu'à présent. Le virus est rapidement neutralisé hors du corps humain, ce qui explique qu'il n'y ait pas contagion par simple contact physique entre malades et personnes bien portantes. Comme on peut l'observer sur le tableau, la proportion de malades toxicomanes est beaucoup plus élevée en Catalogne qu'aux USA ou dans le reste de l'Europe. Une hypothèse raisonnable serait que l'arrivée tardive de la maladie en aurait réduit la pénétration, car nous avons eu connaissance de sa nature et des possibilités de prévention dès la phase première de l'épidémie. Mais la propagation aurait été facilitée dans les groupes où les mesures de prévention sont beaucoup plus difficiles à appliquer. Les possibilités d'influence des services sanitaires dans les milieux de consommation de drogues sont quasi nulles.

En Catalogne beaucoup plus que dans d'autres nations industrialisées, le SIDA doit être considéré comme un aspect de plus du grave problème que représente la toxicomanie pour la santé.



CLASSEMENT PAR POURCENTAGE DES CAS DE SIDA SUIVANT LES GROUPES DE RISQUE AUX U.S.A., EN EUROPE ET EN CATALOGNE.

GROUPES DE RISQUE	U.S.A	EUROPE	CATALOGNE
Homosexuels et bisexuels	64,4	65,1	53,3
Toxicomanes	16,8	9,4	26,7
Homo/bisexuels et toxicomanes	8,2	2,0	3,3
Hémophiles et transfusion	2,6	6,6	10,0
Autres et inconnus	8,2	16,9	6,6
Total	100	100	100