
Streptopus amplexifolius (L.) DC.

Ha estat citat de Comabella per Vayreda (1882), i també apareix en un inventari de l'*Arctostaphylo–Pinetum* aixecat per Gruber (1978) al "versant sud de la Punta de la Sierra (près du Cadi), 1700 m", localitat que desconeixem però que podria correspondre a la rodalia de Gósol, ja que en un altre inventari diu "au–dessus de Gósol, vers la Punta de la Sierra". Atesa la poca versemblanca d'aquestes dues citacions, creiem prudent mantenir reserva sobre la possible presència de l'espècie al territori.

Succisa pratensis Moench


Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 740–1900 m. Indrets de sòl humit (formant part de molleres, herbassars humits i clarianes forestals). *C*.



Succisa pratensis Moench

Swertia perennis L.


Només la coneixem de les molleres basòfiles (*Caricion davallianae*) de Pradell, a l'extrem occidental del Cadí, 1900–2000 m. *RRR*.



Swertia perennis L.

Symphytum officinale L.

Estatge submontà. 900–1300 m. Vernedes (*Alnion incanae*) de sotabosc nitrificat; més rarament herbassars ruderals. *RR*.




Symphytum officinale L.

Symphytum tuberosum L. subsp. **tuberosum**

Només l'hem vist en boscos de ribera de la vall del Riutort, entre Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet, a 800 m. *RRR*.


Fora ja del territori, també a les Nou Fonts, sota Sant Julià de Cerdanyola (DG07).



Symphytum tuberosum L. subsp. *tuberosum*

Tamarix gallica L.

Només n'hem vist un sol exemplar al bosc de ribera del Llobregat, a Guardiola de Berguedà, en un indret de substrat guixenc a 720 m. *RRR*.




Tamarix gallica L.

Tamus communis L.

Estatge submontà. 750–1250 m. Boscos de ribera i bardisses humides. *RR*.


CG87 (Vives, 1964).



Tamus communis L.

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz subsp. **corymbosum**


Estatges submontà i montà; rarament al subalpí. 740–1725 (1960) m. Vorades forestals, boscos clars, matollars i bardisses (sobretot *Quercion pubescenti–sessiliflorae*), en condicions mesòfiles. *C*.



Tanacetum corymbosum (L.) Schultz subsp. *corymbosum*

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.


Estatges submontà i montà. 720–1400 m. Naturalitzat, a partir d'antics cultius, en ambients pertorbats i nitrificats; es troba als murs vells, indrets ruderals i arenys de rius. *RRR*.



Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

Tanacetum vulgare L.

Estatges submontà i montà; rarament al subalpí. 740–1700 (2020) m. Sòls profunds en ambients ruderals (*Dauco–Melilotion*). *C* al nord de l'eix Cadí–Moixeró i a la vall de Gréixer, *RRR* a la resta del territori.



Tanacetum vulgare L.


Taraxacum alpinum (Hoppe) Hegetschw.

Estatges subalpí i alpí. 1975–2450 m. Pastures d'alta muntanya. *RR*.

CSW (Gruber, 1978), SV (Vives, 1964), EN (Llensa, 1946).

CG87 (Vives, 1964), CG88 (Gruber, 1978).


Les plantes del territori han estat referides, en general, a la microespècie **T. panalpinum** v. Soest.



Taraxacum alpinum (Hoppe) Hegetschw.

Taraxacum aquilonare Hand.–Mazz.


Citat per Gruber (1978) en pastures d'alta muntanya de la serra Pedregosa, a 2300 m. *RRR*.



Taraxacum aquilonare Hand.–Mazz.

Taraxacum dissectum (Ledeb.) Ledeb.

Des de l'estatge montà superior fins a l'alpí. (1450) 1600–2540 m. Pastures calcigades (*Poion supinae, Bromion erecti, Juncetea trifidi*). *C*.




Taraxacum dissectum (Ledeb.) Ledeb.

Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.

Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 1200–2040 m. Pastures seques (*Aphyllanthion, Brometalia erecti, Ononidion striatae*). *R*.

PC; CG86 (Vives, 1964).


Si més no les plantes dels sectors MO i TAP, semblen referibles a la microespècie **T. erythrospermum** Andraz. ex Bess.



Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.

Taraxacum obovatum DC.


Citat per Vives (1964) de la font Puda, sota la Pedra, i del serrat dels Prats, sobre Montcalb, a 900 i 1550 m aproximadament. *RRR*.



Taraxacum obovatum DC.

Taraxacum officinale Weber

Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 720–2100 m. Prats, herbassars ruderals, marges de camins,... sobretot en llocs més aviat humits i una mica nitrificats. *CC*.




Taraxacum officinale Weber

Taxus baccata L.

Estatges submontà i montà. 900–1380 m. Boscos (*Fagion sylvaticae*), gairebé sempre en indrets frescals al peu de cingles calcaris. *RRR*, i generalment en peus isolats; només és una mica abundant als engorjats de l'Aigua de Valls, tot i que la zona ha estat molt pertorbada els darrers anys.

Només a la conca del Llobregat–Cardener. (DG07).




Taxus baccata L.

Telephium imperati L. subsp. **imperati**

Estatges submontà i montà; rarament als solells del subalpí. 1000–1700 (2100) m. Vessants pedregosos i assolellats, sovint al peu dels cingles, damunt substrat calcari. *RRR*.


També molt a prop del límit dels sectors CNE i CNW, als solells del marge dret del Segre (CG89, CG99).



Telephium imperati L. subsp. *imperati*

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth


Estatges submontà i montà. 750–1700 m. Sòls humits temporalment, en especial als terrenys argilosos (*Holoschoenetalia vulgaris, Molinietalia coeruleae)*. *C* a les conques del Llobregat i el Cardener, *RR* a la del Segre.



Tetragonolobus maritimus (L.) Roth

Teucrium botrys L.


Estatges submontà i montà. 1100–1750 m. Pradells d'anuals, sovint en codines o sòls remoguts. *R*.



Teucrium botrys L.

Teucrium chamaedrys L. subsp. **pinnatifidum** (Sennen) Rchb f.


Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 740–2210 m. Pastures seques (*Ononido–Rosmarinetea, Xerobromion erecti*), matollars i boscos clars (*Quercion pubescenti–sessiliflorae, Quercion ilicis*), generalment en indrets pedregosos i assolellats. *C*.



Teucrium chamaedrys L. subsp. *pinnatifidum* (Sennen) Rchb f.

Teucrium polium L. subsp. **aureum** (Schreb.) Arcang.

Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 750–2150 m. Pastures seques (*Ononidetalia striatae, Aphyllanthion*), en terrenys rocosos calcaris. *C* al sud de l'eix Cadí–Moixeró, *RRR* al nord (hi sembla limitat a la carena del Moixeró).




Teucrium polium L. subsp. *aureum* (Schreb.) Arcang.

subsp. **capitatum** (L.) Arcang.

Estatges submontà i montà. 1100–1400 m. Pastures seques (*Aphyllanthion, Xerobromion erecti, Ononidion striatae*) en sòls pedregosos. *RR*.


Només a les conques del Segre i del riu de La Vansa.



Teucrium polium L. subsp. *capitatum* (L.) Arcang.

subsp. **polium**


Estatge submontà. 940–1200 m. Pastures seques assolellades (*Aphyllanthion, Xerobromion erecti*). *RRR*.



Teucrium polium L. subsp. *polium*

Teucrium pyrenaicum L. subsp. **guarense** P. Monts.


Des de l'estatge submontà fins a la base de l'alpí. 750–2400 m. Pastures xeròfiles o xeromesòfiles (*Aphyllanthion, Xerobromion erecti, Ononidion striatae*), matollars i boscos clars (*Quercion pubescenti–sessiliflorae, Deschampsio–Pinion, Juniperion nanae*). *CC*.



Teucrium pyrenaicum L. subsp. *guarense* P. Monts.

Thalictrum alpinum L.

Només és conegut del territori per una citació de Gruber (1978) al "Cadi–Cristal", 2610 m. Per l'altitud, aquesta localitat ha de correspondre necessàriament al cim del Vulturó, situat a l'oest del puig de la Canal del Cristall. *RRR*.




Thalictrum alpinum L.

Thalictrum aquilegifolium L.

Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 975–1900 m. Herbassars megafòrbics o humits (*Adenostylion alliariae, Molinio–Arrhenatheretea*), en sòls eutròfics. *RR*.

Només al nord de l'eix Cadí–Moixeró. També apareix al massís dels Rasos de Peguera, no gaire lluny del límit sud del sector EN (DG06).




Thalictrum aquilegifolium L.

Thalictrum flavum L. subsp. **costae** (Timb.–Lagr. ex Debeaux) Rouy & Foucaud [subsp. *simplex* (L.) O. Bolòs & Vigo]

Estatges montà i subalpí. 1240–1900 m. Herbassars humits (*Molinio–Arrhenatheretea*). *RR*.


Només al nord de l'eix Cadí–Moixeró.



Thalictrum flavum L. subsp. ***costae*** (Timb.–Lagr. ex Debeaux) Rouy & Foucad

Thalictrum minus L. subsp. **minus**


Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 850–2000 m. Matollars assolellats (sobretot *Quercion pubescenti–sessiliflorae*, rarament *Juniperion nanae*); també pastures seques i vorades forestals en indrets rocosos. *R*.



Thalictrum minus L. subsp. *minus*

subsp. **pubescens** Schleich. ex Arcang.


Només l'hem observat al torrent Gran —sobre Lletó— a 1690 m i al Montoriol —sobre Cava— a 1875 m, en pastures calcícoles pedregoses. *RRR*.



Thalictrum minus L. subsp. *pubescens* Schleich. ex Arcang.

Thesium alpinum L. subsp. **alpinum**

Estatges montà i subalpí. 1200–2450 m. Pinedes obagues de pi negre o de pi roig (*Rhododendro–Vaccinion, Deschampsio–Pinion*), pastures calcícoles frescals (*Seslerietalia coeruleae, Bromion erecti*). *R*.




Thesium alpinum L. subsp. *alpinum*

Thesium catalaunicum Pedrol & M. Laínz

Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 800–2050 m. Pastures de tendència mesofila (*Aphyllanthion, Bromion erecti*), no rarament formant part del sotabosc de pinedes de pi roig i, generalment, en sòls argilosos temporalment saturats d'aigua. *RR* però localment abundant.


Només el coneixem del sud de l'eix Cadí–Moixeró.



Thesium catalaunicum Pedrol & M. La nz

Thesium humifusum DC.

Estatges submontà i montà. 700–1500 m. Pastures seques assolellades (*Aphyllanthion, Xerobromion erecti*). *R*.



Thesium humifusum DC.


Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. **pyrenaicum**

Gairebé totes les referències bibliogràfiques d'aquest tàxon (Font, 1993; Soriano, 1994) s'han d'atribuir clarament a *T. catalaunicum*, amb el qual havia estat confós. Això no obstant, podrien certament correspondre–hi comptades citacions que apareixen en inventaris de boscos i matollars acidòfils, hàbitats en els quals la presència de *T. catalaunicum* és improbable; aquest és el cas, per exemple, d'un inventari d'un bosquet de bedolls i pi roig (*Veronico urticifoliae–Betuletum pinetosum sylvestris*) de sobre Bastanist, (CNE; CG98), a 1340 m, publicat a Carreras *et al.* (1996a). Malauradament no es conserva cap testimoni d'herbari d'aquesta citació, de manera que la presència de l'espècie al territori resta per confirmar.

Thlaspi arvense L.

Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 1000–2000 m. Camps i ambients ruderals (*Chenopodietalia*). *RR*.


CG76 (Vives, 1964).



Thlaspi arvense L.

Thlaspi brachypetalum Jord.


Estatges montà i subalpí. 1520–1950 m. Pastures mesòfiles (*Bromion erecti*). *R*.



Thlaspi brachypetalum Jord.

Thlaspi perfoliatum L.


Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 750–1900 m. Ambients ruderals, camps, terres remogudes. *C*.



Thlaspi perfoliatum L.

Thymelaea dioica (Gouan) All.

Estatges montà i subalpí; molt rarament al submontà. (950) 1400–2200 m. Fissures de roques calcàries (*Saxifragion mediae*). *RR*.



Thymelaea dioica (Gouan) All.

Thymelaea passerina (L.) Coss. & G.


Espècie citada de Bagà per Cadevall (1933). No hi ha estat retrobada, i potser s'ha extingit per causa de la gran regressió dels sembrats i de la reforestació general al llarg del segle XX.



Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.

Thymelaea pubescens (L.) Meisn. subsp. **pubescens**


Estatge submontà. 950–1350 m. Pastures seques (*Aphyllanthion*). *RR*.



Thymelaea pubescens (L.) Meisn. subsp. *pubescens*

Thymelaea sanamunda All.


Només l'hem vista als vessants solells a l'oest de la Pobla de Lillet, on creix en pastures seques (*Aphyllanthion*) damunt substrat margós, a 840–900 m. *RRR*.



Thymelaea sanamunda All.

Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl. subsp. **nivalis** (Ramond) Nyman


Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 900–2000 m. Xaragalls argilosos, relleixos de cingle, pedruscalls fixats i, rarament, fissures de roques calcàries. *RRR* però localment abundant.



Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl. subsp. *nivalis* (Ramond) Nyman

Thymus froelichianus Opiz, *T. serpyllum* L. subsp. *carniolicus* (Borbás) P. Schmidt

Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 1050–2010 m. Pastures xeròfiles o xeromesòfiles (*Brometalia erecti*) en indrets assolellats, sovint en sòls pedregosos. *C* als sectors nord–orientals, *RR* a la resta.




Thymus froelichianus Opiz

Thymus nervosus Gay ex Willk., *T. serpyllum* L. subsp. *nervosus* (Gay ex Willk.) Nyman

Estatges subalpí i alpí. 1620–2610 m. Pastures d'alta muntanya (sobretot *Festucion scopariae*). *CC*.

On conviuen aquest tàxon i el següent hi pot aparèixer l'híbrid **Thymus** x **nuriensis** Sennen & Pau, que hem observat als sectors MO i TAP (DG18). Havent revisat el plec testimoni corresponent, cal referir a aquest híbrid una citació de *T. serpylloides* de Comabella feta per Vayreda (1902).




Thymus nervosus Gay ex Willk.

Thymus polytrichus A. Kern. ex Borbás, *T. serpyllum* L. subsp. *polytrichus* (A. Kern. ex Borbás) Briq.

Des de l'estatge montà superior fins a l'alpí. 1700–2580 m. Pastures mesòfiles, en sòls acidificats (*Juncetea trifidi, Bromion erecti*). *C* als sectors nord–orientals, *RR* a la resta.


CNE (Gruber, 1978).



Thymus polytrichus A. Kern. ex Borbás

Thymus pseudochamaedrys (Heinr. Braun) Ronniger, *T. serpyllum* L. subsp. *carolii* Sennen & Ronniger


Estatges submontà i montà. 1100–1700 m. Codines i sòls pedregosos damunt substrat silici, fent part de pradells d'anuals (*Sedo–Scleranthion*) i de pastures acidòfiles (*Xerobromion erecti, Chamaespartio–Agrostidenion*). *R*.



Thymus pseudochamaedrys (Heinr. Braun) Ronniger

Thymus pulegioides L., *T. serpyllum* L. subsp. *chamaedrys* (Fr.) Vollm.

Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 740–2250 m. Pastures mesòfiles o mesoxeròfiles (sobretot *Brometalia erecti*); també matollars i boscos clars. *CC*.




Thymus pulegioides L.

Thymus vulgaris L. subsp. **palearensis** (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo

Sobretot als estatges montà i subalpí; més local al submontà. 850–2050 m. Matollars i pastures (sobretot *Ononidion striatae*, també *Aphyllanthion*) en sòls molt pedregosos o damunt substrats tous (margues), fissures de roques calcàries assolellades. *CC* al Port del Comte i a la vall de La Vansa, *C* a la resta d'àrees al sud de l'eix Cadí–Moixeró i aparentment *RR* al vessant nord.


No coneixem amb precisió l'àrea de distribució ni l'abundància d'aquest tàxon, ja que fins no fa gaire no se'l distingia de la subsp. *vulgaris*. És la forma dominant o, segurament, exclusiva a l'alta muntanya. En zones baixes és més localitzat, sembla limitat a determinats substrats (margues) o als hàbitat subrupestres, i possiblement es troba lligat a les zones amb inversió tèrmica hivernal. Als llocs on coincideixen les dues subespècies —situació força freqüent— s'observen plantes amb característiques intermèdies, que poden ser interpretades com a híbrids.



Thymus vulgaris L. subsp. ***palearensis*** (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo

subsp. **vulgaris**

Estatges submontà i montà. 980–1700 m. Matollars i pastures seques (sobretot *Aphyllanthion*, més escàs als *Xerobromion erecti* i *Ononidion striatae*) en llocs assolellats i pedregosos. *CC* o *C* —segons sectors— a les zones baixes, *RR* a l'estatge montà.



Thymus vulgaris L. subsp. *vulgaris*

Thymus zygis L.

Citat de Saldes per Marcet (1912). Es tracta, amb tota probabilitat, d'una confusió.


Tilia cordata Mill.

Citat per Llensa (1946) de l'estret de Llúria, prop de Gresolet (CSE; CG97). Creiem poc versemblant aquesta citació, malgrat l'existència de poblacions de l'espècie al Berguedà central.

Ocasionalment s'observen tells amb pèls axil·lars de les fulles de color ros en lloc de blanc, però amb la resta dels caràcters típics de *T. platyphyllos*, que potser han estat l'origen de citacions com la precedent.

Tilia platyphyllos Scop.


Estatges submontà i montà. 800–1650 m. Boscos i arbredes de caducifolis, en indrets relativament humits (*Fagetalia sylvaticae, Quercetalia pubescentis*). *RR*.



Tilia platyphyllos Scop.

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.


Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 1000–1900 m. Molleres (*Caricetalia davallianae*), herbassars higròfils (*Molinion coeruleae*) i talussos amb circulació subsuperficial d'aigua carbonatada. *RRR*.



Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Tordylium maximum L.


Estatges submontà i montà. 740–1700 m. Herbassars nitròfils (*Onopordetalia*). *RR*.
SV; CG87 (Vives, 1964).



Tordylium maximum L.

Torilis arvensis (Huds.) Link


Estatges submontà i montà. 900–1570 m. Herbassars nitròfils, en ambients ruderals o vorades de bosc. *RR*.
PC; CG87 (Vives, 1964).



Torilis arvensis (Huds.) Link

Torilis japonica (Houtt.) DC.


Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 720–1800 (2100) m. Herbassars nitròfils. *C*.
CG87 (Vives, 1964).



Torilis japonica (Houtt.) DC.

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

Estatge submontà. 740–1300 m. Ambients ruderals, en llocs més aviat secs. *RRR*.
SV; CG86 (Vives, 1964).




Torilis nodosa (L.) Gaertn.

Tragopogon pratensis L.

Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 740–1960 m. Pastures mesòfiles (*Bromion erecti*), prats de dall (*Arrhenatherion*) i herbassars nitròfils (*Onopordetalia*); més rarament pastures de tendència seca (*Aphyllanthion*). *R*.


Gairebé tots els exemplars observats corresponen a la subsp. **pratensis**, i hi ha poca informació fiable sobre altres tàxons subespecífics. Hem vist plantes amb les característiques de la subsp. **orientalis** (L.) Celak. en un prat de dall de Bagà (TAP; DG07); aquesta subespècie també ha estat assenyalada per Font (1989) als sectors CNE, CSW, PC i MO (CG87, CG98, DG08) i per Montserrat (1957) a la Seu d'Urgell (prop de CNW; CG78). En una pastura seca entre Adraén i Ortedó (CNW; CG78) n'hem vist d'atribuïbles a la subsp. **minor** (Mill.) Wahlenb.



Tragopogon pratensis L.

Tragus racemosus (L.) All.

Espècie no observada dins el territori, però citada ran del límit del sector CNE per Hernández (1982), en un talús sorrenc de Martinet. UTM CG99




Tragus racemosus (L.) All.

Trifolium alpinum L.

Estatges subalpí i alpí. 1700–2540 m. Pastures acidòfiles (*Caricetalia curvulae*). *CC* al sector TAP, *R* o *RR* a la resta.


CG76 (Vives, 1964).



Trifolium alpinum L.

Trifolium angustifolium L.


Observat únicament a Gréixer, en marges assolellats damunt substrat silici, a 1100 m. *RRR*.



Trifolium angustifolium L.

Trifolium arvense L.


Estatges submontà i montà. 860–1600 m. Pradells d'anuals, damunt substrat silici o en sòls descarbonatats (*Festuco–Sedetalia*). *C*.



Trifolium arvense L.

Trifolium aureum Pollich


Estatge montà. 1250–1660 m. Vorades de boscos mesòfils i mulladius, damunt substrat silici. *RR*.



Trifolium aureum Pollich

Trifolium campestre Schreb.


Estatges submontà i montà. 720–1580 m. Sobretot als pradells d'anuals (*Festuco–Sedetalia*); també als marges de camins i altres indrets ruderalitzats. *R*.



Trifolium campestre Schreb.

Trifolium dubium Sibth.

Estatges submontà i montà. 1250–1550 m. Indrets humits, almenys temporalment (prats mesòfils, mulladius, vorades de bosc). *RRR*.




Trifolium dubium Sibth.

Trifolium fragiferum L.

Estatge submontà; ocasional al montà. 800–1000 (1660) m. Prats calcigats, prop d'ambients ruderals. *RRR*.

Només a les conques del Llobregat i del Cardener.


SV (Vives, 1964).



Trifolium fragiferum L.

Trifolium medium L. subsp. **medium**


Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 750–1990 m. Vorades i clarianes de boscos mesòfils (*Trifolion medii*). *C* o *R*, segons sectors.



Trifolium medium L. subsp. *medium*

Trifolium montanum L.

Des de l'estatge submontà fins a la base de l'alpí. 850–2450 m. Pastures mesòfiles (*Bromion erecti*). *CC*.




Trifolium montanum L.

Trifolium ochroleucon Huds.

Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 950–2170 m. Vorades de bosc, pastures de tendència mesòfila (*Brometalia erecti*); més corrent als sòls una mica àcids. *R*.


CG87 (Vives, 1964).



Trifolium ochroleucon Huds.

Trifolium pratense L. subsp. **pratense**


Des de l'estatge submontà fins a la base de l'alpí. 720–2450 m. Comunitats herbàcies molt diverses (pastures mesòfiles, prats humits,...). *CC*.



Trifolium pratense L. subsp. *pratense*

Trifolium repens L.

Des de l'estatge submontà fins a l'alpí. 720–2500 m. Comunitat herbàcies molt diverses (pastures mesòfiles, prats humits, ambients ruderals,...). *CC*.




Trifolium repens L.

Trifolium rubens L.

Estatges submontà i montà. 1100–1700 m. Vorades i clarianes de bosc (*Geranion sanguinei*), amb preferència pels substrats silicis. *R* o *RR*, segons sectors.

SV (Vives, 1964).


(CG96).



Trifolium rubens L.

Trifolium scabrum L.


Estatges submontà i montà. 920–1460 m. Pradells d'anuals en codines (*Festuco–Sedetalia*). *R*.



Trifolium scabrum L.

Trifolium spadiceum L.


Observat només en una mollera acidòfila (*Caricetalia fuscae*) del Pletissar de Dalt, la Molina, a 1750 m. *RRR*.



Trifolium spadiceum L.

Trifolium striatum L.

Estatges submontà i montà. 1100–1550 m. Pradells d'anuals (*Festuco–Sedetalia*) damunt substrat silici. *R*.




Trifolium striatum L.

Trifolium strictum L.

Citat —com a *T. laevigatum* Poiret— de Comabella per Vayreda (1902). No hi ha estat retrobat.

Trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel.


L'hem observat únicament en pradells d'anuals silicícoles damunt la Bastida d'Hortons, a 1100 m. *RRR*.



Trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel.

Trifolium thalii Vill.


Estatges subalpí i alpí. 1790–2500 m. Pastures mesòfiles (*Bromion erecti, Primulion intricatae, Festucion supinae*). *R* o *RR*, segons sectors.



Trifolium thalii Vill.

Triglochin palustre L.


Sobretot als estatges montà i subalpí; rarament al submontà. 750–2050 m. Molleres (*Caricetalia davallianae*) i altres ambients aigualosos. *RR*, però localment abundant.



Triglochin palustre L.

Trigonella monspeliaca L.


Estatges submontà i montà. 900–1430 m. Pradells d'anuals (*Festuco–Sedetalia*). *RRR*.



Trigonella monspeliaca L.

Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. **glauca**


Des de l'estatge submontà fins a l'alpí. 850–2580 m. Pastures seques en indrets pedregosos (sobretot *Ononidetalia striatae*). *C*.



Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. *glauca*

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 780–1900 m. Prats de dall (*Arrhenatheretalia*) i pastures mesòfiles (*Bromion erecti*); també, escàs, en altres comunitats pratenses. *C.*



Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.


Triticum aestivum L.

El blat es presenta no rares vegades com a planta subespontània en marges de conreus i de camins. L'hem observat als sectors CNW i CNE (UTM CG88 i CG98).

Trollius europaeus L.

Sobretot als estatges montà i subalpí; molt rarament al submontà, a la Cerdanya. 1140–2130 m. Prats i herbassars humits, en sòls eutròfics. *C* a la Cerdanya, *RR* o *RRR* a la resta.

També prop del límit meridional del sector EN, als Rasos de Peguera (CG96, DG06).




Trollius europaeus L.

Tulipa sylvestris L. subsp. **australis** (Link) Pamp.

Estatges montà superior i subalpí. Pastures xeròfiles o mesoxeròfiles (*Festucion scopariae, Ononidion striatae*), en indrets pedregosos o pertorbats pel bestiar. 1700–2240. *RRR.*


PC; CG77 (Romo, 1985a).



Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp.

Tussilago farfara L.


Des de l'estatge submontà fins al subalpí. 750–2200 m. Talussos argilosos humits, molt sovint en marges de camins o en terrenys aixaragallats. *C.*



Tussilago farfara L.

Typha angustifolia L.


Estatges submontà i montà. 800–1400 m. Indrets amb aigua embassada. *RRR.*



Typha angustifolia L.

Typha latifolia L.


Estatge submontà; molt rara al montà. 720–1720 m. Indrets amb aigua embassada. *RR*.



Typha latifolia L.

Ulmus minor Mill.


Estatges submontà i montà. 730–1450 m. Boscos de ribera i bardisses. *R*.



Ulmus minor Mill.

Ulmus glabra Huds.


Estatges submontà i montà. 800–1400 m. Fondals humits dins boscos de vessant i boscos de ribera. *RR*.



Ulmus glabra Huds.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy


Només l'hem observat en relleixos de roques silícies del barranc d'Ortedó, a 1000 m. *RRR*.



Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt


Observat únicament en una pastura seca (*Aphyllanthion*) de Fórnols, a 1100 m. *RRR*.



Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Urtica dioica L.

Sobretot als estatges submontà i montà; menys corrent al subalpí i molt rara a la base de l'alpí. 740-2400 m. Herbassars nitròfils en ambients ruderals, indrets freqüentats pel bestiar i vorades de bosc. *CC*.



Urtica dioica L.