

New checklist of spanish mosses

Creu Casas

Botànica. Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra.

Abstract. This checklist of the mosses of Spain is the result of the revision and correction of the one published ten years ago. Annotations and new references are provided for those exclusions and additions to the earlier list, which is here increased with ca. 50 new records.

Resum. *Nou llistat de les molses d'Espanya.* Aquest treball és el resultat de la revisió i correcció del primer llistat de molses d'Espanya publicat ara fa deu anys. Notes i referències justifiquen l'exclusió i l'addició d'una cinquentena de taxons recollits recentment al país.

Introduction

The number of species to be encountered in Spain, since I published the last checklist of spanish mosses (C. Casas 1981. The mosses of Spain, an annotated checklist. Treballs Institut Botànic Barcelona 7: 1-57), has greatly increased, mostly due to the work of a growing number of bryologists committed to the exploration and study of the moss flora of poorly known areas in our country.

On the other hand, well experienced bryologists have pointed out to me some errors observed by them, regarding certain species included in the earlier list. These are mostly taxa with a more northern distribution, which could not occur in the Iberian Peninsula, given its geographic situation (i.e., *Anomodon rugelii*, pers. com. P. Stormer; *Sphagnum angermanicum* pers. com. R. Gauthier). Upon verifying on the herbarium specimens in BCB and checking all errors, these species have been excluded from the checklist.

Synonyms have been considered following, basically, M.F.V. Corley, A.C. Crundwell, R. Düll, M.O. Hill & A.J.E. Smith 1981 (Mosses of Europe and the Azores, an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. J. Bryol. 11: 609-689), with those modifications later established. For the systematic arrangement, the criterium proposed by L.E. Anderson, H.A. Crum & W.R. Buck 1990 (List of the mosses of North America north of Mexico. Bryologist 93: 448-499) has been adopted. For annotations and most usual synonyms appearing in early spanish literature, the reader shall refer to the first checklist, as annotations and references in the present checklist only apply to the novelties.

Alphabetic checklist

- Acaulon* C. Müll. (Pottiaceae) (1)
casasianum Brugués & Crum (2)
dertosense Casas, Sérgio, Cros & Brugués (3)
fontquierianum Casas & Sérgio (4)
muticum (Hedw.) C. Müll.
 var. *muticum*
 var. *mediterraneum* (Limpr.) Sérgio (5)
triquetrum (Spruce) C. Müll.
- Aloina* Kindb. (Pottiaceae)
alooides (K.F. Schultz) Kindb.
ambigua (B. & S.) Limpr.
bifrons (De Not.) Delg.
rigida (Hedw.) Limpr.
- Amblyodon* B. & S. (Meesiaceae)
dealbatus (Hedw.) B. & S.
- Amblystegium* B., S. & G. (Amblystegiaceae)
compactum (C. Müll.) Aust.
 (Conardia compacta)
confervoides (Brid.) B., S. & G.
fluvatile (Hedw.) B., S. & G.
humile (P. Beauv.) Crundw.
jungermannioides (Brid.) A.J.E. Sm.
 (Platydictya jungermannioides)
riparium (Hedw.) B., S. & G.
serpens (Hedw.) B., S. & G.
 var. *serpens*
 var. *saxicola* (A. Hans.) C. Jens.
subtile (Hedw.) B., S. & G.
tenax (Hedw.) C. Jens.
varium (Hedw.) Lindb.
- Amphidium* Schimp. (Orthotrichaceae)
lapponicum (Hedw.) Schimp.
mougeotii (B. & S.) Schimp.
- Anacolia* Schimp. (Bartramiaceae)
webbii (Mont.) Schimp.
- Andreaea* Hedw. (Andreaeaceae) (6)
alpestris (Thed.) Schimp.
frigida Hüb.
heinemannii Hampe & C. Müll.
nivalis Hook.
rothii Web. & Mohr
 ssp. *falcata* (Schimp.) Lindb.
 ssp. *rothii*
rupestris Hedw.
mutabilis Hook. f. & Wils.
- Anoectangium* Schwaegr. (Pottiaceae)
aestivum (Hedw.) Mitt.
- Anomobryum* Schimp. (Bryaceae)
juraceum (Gaertn., Meyer & Scherb.) Schimp.
 var. *concinnum* (Spruce) Zett.
 var. *juraceum*
lusitanicum (I. Hag. ex Luis.) Thér. (89)
- Anomodon* Hook. & Tayl. (Anomodontaceae)
attenuatus (Hedw.) Hüb.
longifolius (Brid.) Hartm.
rostratus (Hedw.) Schimp.
viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl.
- Antitrichia* Brid. (Leucodontaceae)
californica Sull.
curtipendula (Hedw.) Brid.
- Aphanorhagma* Sull. (Funariaceae)
patens (Hedw.) Lindb.
- Archidium* Brid. (Archidiaceae)
alternifolium (Hedw.) Schimp.
- Arctoa* B., S. & G. (Dicranaceae)
fulvella (Dicks.) B., S. & G.
- Aschisma* Lindb. (Pottiaceae)
carniolicum (Web. & Mohr) Lindb.
 var. *speciosum* Limpr.
- Atrichum* P. Beauv. (Polytrichaceae)
angustatum (Brid.) B. & S.
undulatum (Hedw.) P. Beauv.
- Aulacomnium* Schwaegr. (Aulacomniaceae)
androgynum (Hedw.) Schwaegr.
palustre (Hedw.) Schwaegr.
 var. *fasciculare* Brid.
 var. *palustre*
- Barbula* Hedw. (Pottiaceae)
convoluta Hedw.
 var. *commutata* (Jur.) Husn.
 var. *convoluta*
 var. *sardoa* Schimp.
crocea (Brid.) Web. & Mohr
ehrenbergii (Lor.) Fleisch.
unguiculata Hedw.

- Bartramia Hedw. (Bartramiaceae)**
- halleriana Hedw.
 - ithyphylla Brid.
 - pomiformis Hedw.
 - var. elongata Turn.
 - var. pomiformis
 - stricta Brid.
- Blindia B., S. & G. (Seligeriaceae)**
- acuta (Hedw.) B., S. & G.
 - var. acuta
 - var. arenacea Mol.
- Brachydontium Fürnr. (Seligeriaceae)**
- trichodes (Web.) Milde (89)
- Brachythecium B., S. & G. (Brachytheciaceae)**
- albicans (Hedw.) B., S. & G.
 - campestre (C. Müll.) B., S. & G.
 - fendleri (Sull.) Jaeg.
 - glaciale B., S. & G.
 - glareosum (Spruce) B., S. & G.
 - mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde
 - olympicum Jur.
 - plumosum (Hedw.) B., S. & G.
 - populeum (Hedw.) B., S. & G.
 - reflexum (Starke) B., S. & G.
 - rivulare B., S. & G.
 - rutabulum (Hedw.) B., S. & G.
 - salebosum (Web. & Mohr) B., S. & G.
 - starkei (Brid.) B., S. & G.
 - velutinum (Hedw.) B., S. & G.
 - var. salicinum (B., S. & G.) Müll.
 - var. velutinum
- Breutelia Schimp. (Bartramiaceae)**
- chrysocoma (Hedw.) Lindb.
- Bruchia Schwaegr. (Bruchiaceae)**
- vogesiaca Schwaegr. (8)
- Bryoerythrophyllum Chen (Pottiaceae)**
- ferruginascens (Stirt.) Giac.
 - inaequalifolium (Tayl.) Zander (9)
 - recurvirostrum (Hedw.) Chen
- Bryum Hedw. (Bryaceae)**
- algovicum Sendtn. ex C. Müll.
 - alpinum With.
 - var. alpinum
 - var. meridionale Schimp.
 - var. viride Husn.
 - arcticum (R. Brown) B., S. & G.
 - argenteum Hedw.
 - var. argenteum
 - var. lanatum (P. Beauv.) B., S. & G.
 - bicolor Dicks.
 - blindii B., S. & G.
 - bornholmense Winkelm. & Ruthe
 - caespiticium Hedw.
 - var. badium Brid.
 - var. caespiticium
 - var. comense (Schimp.) Husn.
 - var. imbricatum B., S. & G.
 - canariense Brid.
 - var. provinciale (Philib.) Husn.
 - capillare Hedw.
 - var. capillare
 - var. *flaccidum* B., S. & G.
 - (Bryum subelegans) (13)
 - var. meridionale Schimp.
 - var. ustulatum Roth
 - creberrimum Tayl.
 - cyclophyllum (Schwaegr.) B. & S.
 - donianum Grev.
 - dunense A.J.E. Sm. & H. Whiteh. (10)
 - elegans Nees ex Brid.
 - funckii Schwaegr.
 - gemmaferum Wilcz. & Demar. (11)
 - gemmilucens Wilcz. & Demar. (12)
 - gemmaparum De Not.
 - imbricatum (Schwaegr.) B. & S.
 - inclinatum (Brid.) Bland.
 - (Bryum imbricatum)
 - intermedium (Brid.) Bland.
 - klinggraeffii Schimp.
 - laevifolium* Syed
 - (Bryum subelegans) (13)
 - microerythrocarpum* C. Müll. & Kindb.
 - (Bryum subapiculatum)
 - mildeanum Jur.
 - muehlenbeckii B., S. & G.
 - neodamense Itzig. ex C. Müll.
 - pallens Sw.
 - var. alpinum (B., S. & G.) Podp.
 - pallescens Schleich. ex Schwaegr.
 - pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb.
 - var. bimun (Schreb.) Lilj.
 - var. pseudotriquetrum
 - radiculosum Brid.
 - rubens Mitt.
 - ruderale Crundw. & Nyh.
 - rufifolium (Dix.) Demaret & Wilczek
 - sauteri B., S. & G.

- schleicheri* Lam. & DC.
 var. *latifolium* (Schwaegr.) Schimp.
 var. *schleicheri*
- subapiculatum* Hampe (14)
subelegans Kindb. (13)
torquescens B. & S.
turbinatum (Hedw.) Turn.
uliginosum (Brid.) B. & S.
weigelii Spreng.
- Buxbaumia* Hedw. (Buxbaumiaceae)
aphylla Hedw.
viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex
 Moug. & Nestl.
- Callialaria* Ochyra (Amblystegiaceae)
curvicaulis (Jur.) Ochyra
 (Cratoneuron curvicaule) (19)
- Callicladium* Crum (Hypnaceae)
haldanianum (Grev.) Crum (89)
- Calliergon* (Sull.) Kindb. (Amblystegiaceae)
cordifolium (Hedw.) Kindb.
giganteum (Schimp.) Kindb.
sarmentosum (Wahlenb.) Kindb.
stramineum (Brid.) Kindb.
- Calliergonella* Loeske (Amblystegiaceae)
cuspidata (Hedw.) Loeske
- Campylium* (Sull.) Mitt. (Amblystegiaceae)
calcareum Crundw. & Nyh.
chrysophyllum (Brid.) J. Lange
halleri (Hedw.) Lindb.
polygamum (B., S. & G.) J. Lange & C. Jens.
stellatum (Hedw.) J. Lange & C. Jens.
 var. *protensum* (Brid.) Bryhn. ex Grout.
 var. *stellatum*
- Campylopus* Brid. (Dicranaceae)
atrovirens De Not.
brevipilus B., S. & G.
flexuosus (Hedw.) Brid.
fragilis (Brid.) B., S. & G.
introflexus (Hedw.) Brid.
oerstedianus (C. Müll.) Mitt.
pilifer Brid.
pyriformis (K.F. Schultz) Brid.
schimperi Milde (15)
setifolius Wils.
subulatus Schimp.
- Campylostelium* B., S. & G. (Ptychomitriaceae)
saxicola (Web. & Mohr) B., S. & G.
strictum Solms
- Catoscopium* Brid. (Catascopiacae)
nigrum (Hedw.) Brid.
- Ceratodon* Brid. (Ditrichaceae)
conicus (Hampe ex C. Müll.) Lindb.
purpureus (Hedw.) Brid.
 var. *brevifolius* Milde
 var. *flavisetus* Limpr.
 var. *pallidisetus* Luis.
 var. *purpureus*
- Cheilotrichia* Lindb. (Ditrichaceae)
chloropus (Brid.) Lindb.
- Chenia* Zander (Pottiaceae)
rhizophylla (Sak.) Zander (16)
- Cinclidotus* P. Beauv. (Pottiaceae)
aquaticus (Hedw.) B. & S.
fontinaloides (Hedw.) P. Beauv.
mucronatus (Brid.) Mach.
 var. *fragilifolius* Biz. & Roux (17)
 var. *mucronatus*
riparius (Brid.) Arnott
- Cirriphyllum* Grout (Brachytheciaceae) (18)
cirrosum (Schwaegr.) Grout
crassinervium (Tayl.) Loeske & Fleisch.
 (Eurhynchium crassinervium)
germanicum (Grebe) Loeske & Fleisch.
 (Rhynchosstiella tenuicaulis)
piliferum (Hedw.) Grout
reichenbachianum (Hüb.) Wijk & Marg.
 (Eurhynchium flotowianum)
tenuinerve (Lindb.) Wijk & Marg.
 (Cirriphyllum tommasinii)
tomasinii (Sendtn. ex Boul.) Grout
- Claopodium* (Lesq. & James) Ren. & Card.
 (Leskeaceae)
whippleanum (Sull.) Ren. & Card.
 var. *cavernicola* Luis.
 var. *whippleanum*
- Clasmatodon* Hook. f. & Wils. (Fabroniaceae)
parvulus (Hampe) Sull.
- Climaciumpunctatum* Web. & Mohr (Climaciaceae)
dendroides (Hedw.) Web. & Mohr

- Conardia** Robins. (Amblystegiaceae)
compacta (C. Müll.) Robins.
- Conostomum** Sw. (Bartramiaceae)
tetragonum (Hedw.) Lindb.
- Coscinodon** Spreng. (Grimmiaceae)
cribrosus (Hedw.) Spruce
 var. *brevipila* Fleisch. & Warnst.
 var. *cribosus*
- Cratoneuron** (Sull.) Spruce (Amblystegiaceae)
(19)
commutatum (Hedw.) G. Roth
 (Palustriella commutata)
 var. *commutatum*
 var. *falcatum* (Brid.) Mönk.
 (Palustriella commutata var. falcata)
 var. *fluctuans* (B., S. & G.) Wijk &
 Marg.
 (Palustriella commutata var. fluctuans)
 var. *sulcatum* (Lindb.) Mönk.
 (Palustriella commutata var. sulcata)
curvicaule (Jur.) G. Roth
decipiens (De Not.) Loeske
 (Palustriella decipiens)
filicinum (Hedw.) Spruce
 var. *atrovirens* (Brid.) Ochyra
 var. *curvicaule* (Jur.) Mönk.
 (Cratoneuron curvicaule)
 var. *filicinum*
- Crossidium** Jur. (Pottiaceae)
aberrans Holz. & Bartr. (20)
crassinerve (De Not.) Jur.
squamiferum (Viv.) Jur.
 var. *pottioideum* (De Not.) Mönk.
 var. *squamiferum*
- Cryphaea** Mohr (Cryphaeaceae)
heteromalla (Hedw.) Mohr
lamyana (Mont.) C. Müll.
- Ctenidium** (Schimp.) Mitt. (Hypnaceae)
molluscum (Hedw.) Mitt.
 var. *molluscum*
 var. *robustum* Boul.
 var. *sericeum* Zett.
procerrimum (Mol.) Lindb.
- Cyclodyction** Mitt. (Callichistaceae)
laetevirens (Hook. & Tayl.) Mitt.
- Cynodontium** Schimp. (Dicranaceae)
bruntonii (Sm.) B., S. & G.
gracilescens (Web. & Mohr) Schimp. (15)
polycarpon (Hedw.) Schimp.
strumiferum (Hedw.) Lindb. (15)
- Desmatodon** Brid. (Pottiaceae)
guepinii B. & S.
heimii (Hedw.) Mitt. (58)
latifolius (Hedw.) Brid.
 var. *latifolius*
 var. *muticus* (Brid.) Brid.
- Dichelyma** Myr. (Fontinalaceae)
falcatum (Hedw.) Myr. (21)
- Dichodontium** Schimp. (Dicranaceae)
flavescens (Dicks.) Lindb.
pellucidum (Hedw.) Schimp.
 var. *pellucidum*
 var. *fragimontanum* Brid.
 var. *propagulifera* (Corr.) Cas. Gil
- Dicranella** (C. Müll.) Schimp. (Dicranaceae)
grevilleana (Brid.) Schimp.
heteromalla (Hedw.) Schimp.
howei Ren. & Card. (22)
palustris (Dicks.) Crundw. ex E. Warb.
rufescens (Dicks.) Schimp.
schreberiana (Hedw.) Dix.
staphylina H. Whiteh. (7)
subulata (Hedw.) Schimp.
 var. *curvata* (Hedw.) Rabenh.
 var. *subulata*
varia (Hedw.) Schimp.
- Dicranodontium** B., S. & G. (Dicranaceae)
denudatum (Brid.) Britt.
uncinatum (Harv.) Jaeg.
- Dicranoweisia** Lindb. ex Milde (Dicranaceae)
cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde
crispula (Hedw.) Milde
- Dicranum** Hedw. (Dicranaceae)
bergeri Bland. ex Hoppe
bonjeanii De Not.
congestum Brid.
flagellare Hedw.
fuscescens Sm.
leioneuron Kindb. (23)
majus Sm.

- montanum* Hedw.
muehlenbeckii B., S. & G.
 var. *muehlenbeckii*
 var. *neglectum* (De Not.) Pfeff.
polystetum Sw.
scoparium Hedw.
scottianum Turn.
 ssp. *canariense* (Hampe) Corb.
spurium Hedw.
tauricum Sap.
- Didymodon** Hedw. (Pottiaceae) (24)
acus (Brid.) Saito
asperifolius (Mitt.) Crum, Steere & Anderson
 (25)
cordatus Jur.
fallax (Hedw.) Zander
ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M. Hill
icmadophilus (Schimp. ex C. Müll.) K. Saito
insulanus (De Not) M. Hill
luridus Hornsch. ex Spreng.
 var. *luridus*
 var. *nicholsonii*
 (Didymodon nicholsonii)
nicholsonii Culm. (26)
rigidicalis (C. Müll.) K. Saito
 (Didymodon ferrugineus)
rigidulus Hedw.
 var. *gracilis* (Schleich. ex Hook. & Grev.)
 Zander
 (Didymodon acutus)
 var. *icmadophilus* (Shimp. ex C. Müll.)
 Zander
 (Didymodon icmadophilus)
sinuosus (Mitt.) Delogne
soaresii Luis.
spadiceus (Mitt.) Limpr.
tophaceus (Brid.) Lisa
vinealis (Brid.) Zander
 var. *flaccidus* (B. & S. in Schimp.) Zander
 (Didymodon insulanus)
 var. *luridus* (Hornsch. in Spreng.) Zander
 (Didymodon luridus)
 var. *nicholsonii* (Culm.) Zander
 (Didymodon nicholsonii)
- Diphyscium** Mohr (Buxbaumiaceae)
foliosum (Hedw.) Mohr
- Distichium** B., S. & G. (Ditrichaceae)
capillaceum (Hedw.) B., S. & G.
inclinatum (Hedw.) B., S. & G.
- Ditrichum* Hampe (Ditrichaceae)
crispatissimum (C. Müll.) Par. (27)
cylindricum (Hedw.) Grout
flexicaule (Schwaegr.) Hampe
heteromallum (Hedw.) Britt.
lineare (Sw.) Lindb. (28)
pallidum (Hedw.) Hampe
pusillum (Hedw.) Hampe (7)
subulatum Hampe
zonatum (Brid.) Braithw.
- Drepanocladus** (C. Müll.) G. Roth (Amblystegiaceae)
aduncus (Hedw.) Warnst.
exannulatus (B., S. & G.) Warnst.
 (Warnstorffia exannulata) (83)
 var. *purpurascens* (Schimp.) Herz.
 (Warnstorffia exannulata var. purpurascens)
fluitans (Hedw.) Warnst.
 (Warnstorffia fluitans) (83)
revolvens (Sw.) Warnst.
 (Limprichtia revolvens)
 var. *intermedius* (Lindb.) Grout
 (Limprichtia cossonii)
sendtnieri (Schimp. ex H. Müll.) Warnst.
uncinatus (Hedw.) Warnst.
 (Sanionia uncinata) (67)
vernicosus (Mitt.) Warnst.
 (Hamatocaulis vernicosus) (39)
- Dryptodon** Brid. (Grimmiaceae)
patens (Hedw.) Brid.
- Encalypta** Hedw. (Encalyptaceae)
affinis Hedw. f.
alpina Sm.
ciliata Hedw.
rhaftocarpa Schwaege.
spathulata C. Müll.
streptocarpa Hedw.
vulgaris Hedw.
 var. *mutica* Brid.
 var. *vulgaris*
- Entodon** C. Müll. (Entodontaceae)
cladorrhizans (Hedw.) C. Müll.
concinnum (De Not.) Par.
- Entosthodon** Schwaege. (Funariaceae)
attenuatus (Dicks.) Bryhn
duriuei Mont.

- var. durieui
 var. mustaphae Trab.
fascicularis (Hedw.) C. Müll.
hungaricus (Boros) Loeske
obtusus (Hedw.) Lindb.
pallescens Jur.
 var. *mitratus* (Cas. Gil) Wijk & Marg.
 var. *pallescens*
- Ephemerum** Hampe (Ephemeraceae) (29)
minutissimum Lindb.
recurvifolium (Dicks.) Boul.
serratum (Hedw.) Hampe
sessile (Bruch) C. Müll.
- Epiphygium** Lindb. (Bryaceae)
tozeri (Grev.) Lindb.
- Eucladium** B., S. & G. (Pottiaceae)
verticillatum (Brid.) B., S. & G.
- Eurhynchium** B., S. & G. (Brachytheciaceae)
angustirete (Broth.) T. Kop.
crassinervium (Wils.) Schimp. (18)
fiotowanum (Sendtn.) Kart. (18)
hians (Hedw.) Sande Lac.
meridionale (B., S. & G.) De Not.
praelongum (Hedw.) B., S. & G. (45)
 var. *praelongum*
 var. *stokesii* (Turn.) Dix.
pulchellum (Hedw.) Jenn.
 var. *diversifolium* (B., S. & G.) C. Jens
 var. *praecox* (Hedw.) Dix.
 var. *pulchellum*
pumilum (Wils.) Schimp.
schleicheri (Hedw. f.) Jur.
speciosum (Brid.) Jur.
striatum (Spruce) B., S. & G.
striatum (Hedw.) Schimp.
swartzii (Turn.) Warnst.
 (*Eurhynchium hians*)
- Fabronia** Raddi (Fabroniaceae)
ciliaris (Brid.) Brid.
pusilla Raddi.
- Fissidens** Hedw. (Fissidentaceae)
adianthoides Hedw.
algarvicus Solms
bryoides Hedw.
 var. *bryoides*
 var. *caespitans* Schimp. (30)
 var. *inconstans* (Schimp.) Ruthe
- crassipes* Wils. ex Bruch & Schimp. in B., S. & G. (31)
 ssp. *crassipes*
 ssp. *warnstorffii* (Fleisch.) Brugg.-Nann.
cristatus Wils. ex Mitt.
 (*Fissidens dubius*)
curnovii Mitt.
 (*Fissidens bryoides* var. *caespitans*)
dubius Beauv. (32)
exilis Hedw.
gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyh. (33)
grandifrons Brid.
incurvus Starke ex Röhl.
 var. *tenuifolius* Boul.
 (*Fissidens gracilifolius*)
kosaninii Latz.
limbatus Sull.
monguillonii Thér. (30)
mouretii Corb. (89)
osmundooides Hedw.
ovatifolius Ruthe in Limpr. (30)
polyphyllus Wils. ex B., S. & G.
 var. *newtonii* Husn.
 var. *polyphyllus*
pusillus (Wils.) Milde.
rivularis (Spruce) Schimp. in B., S. & G.
rufulus B., S. & G.
serrulatus Brid.
taxifolius Hedw.
 ssp. *pallidicaulis* (Mitt.) Mönk.
 ssp. *taxifolius*
viridulus (Sw.) Wahlb.
 var. *bambergeti* (Schimp. ex Milde) Waldh.
 var. *viridulus*
- Fontinalis** Hedw. (Fontinalaceae)
antipyretica Hedw.
 var. *antipyretica*
 ssp. *lachenaudii* (Card.) Podp. (89)
dalecarlica B., S. & G.
hypnoides Hartm.
 var. *duriæi* (Schimp.) Kindb.
 var. *hypnoides*
squamosa Hedw.
- Funaria** Hedw. (Funariaceae)
convexa Spruce
curviseta (Schwaegr.) Milde
 (*Funariella curviseta*)
hygrometrica Hedw.
muhlenbergii Turn.
pulchella Philib.

- Funariella* Sérgio (Funariaceae)
curviseta (Schwaegr.) Sérgio (34)
- Gigaspermum* Lindb. (Gigaspermaceae)
mouretii Corb.
- Goniomitrium* Hook. f. & Wils. (Funariaceae)
seroi Casas
- Grimmia* Hedw. (Grimmiaceae)
affinis Hornsch.
alpestris (Web. & Mohr) Schleich. ex Hornsch.
anodon B. & S.
anomala Hampe ex Schimp.
atrrata Mielichh. ex Hoppe & Hornsch.
caespiticia (Brid.) Jur.
crinita Brid.
decipiens (K.F. Schultz) Lindb.
donniana Sm.
 var. *curvula* Spruce
 var. *donniana*
elatior Bruch ex Bals. & De Not.
elongata Kaulf.
funalis (Schwaegr.) B. & S.
hartmanii Schimp.
incurva Schwaegr. (35)
laevigata (Brid.) Brid.
montana B. & S.
orbicularis Bruch ex Wils.
ovalis (Hedw.) Lindb.
pitardii Corb.
pulvinata (Hedw.) Sm.
pyrenaica Kern. (89)
retracta Stirz.
sessitana De Not.
tergestina Tomm. ex B., S. & G.
 var. *pocilostoma* (Card. & Seb.) Loeske
 var. *tergestina*
torquata Hornsch. ex Grev.
trichophylla Grev.
 var. *brachycarpa* De Not.
 var. *meridionalis* Schimp.
 (*Grimmia trichophylla* var. *brachycarpa*)
 var. *subsquarrosa* (Wils.) A.J.E. Sm.
 var. *tenuis* (Wahlemb.) Wijk & Marg.
 var. *trichophylla*
 ssp. *lisae* (De Not.) Boul.
 (*Grimmia trichophylla* var. *brachycarpa*)
unicolor Hook.
- calcareum* Nees & Hornsch.
luisieri (Sérgio) Sérgio ex Crundw. (36)
 (*Gymnostomum viridulum*)
mosis (Lor.) Jur. & Milde (38)
viridulum Brid. (37)
- Gyroweisia* Schimp. (Pottiaceae)
reflexa (Brid.) Schimp.
tenuis (Hedw.) Schimp.
- Habrodon* Schimp. (Leskeaceae)
perpusillus (De Not.) Lindb.
- Hedwigia* P. Beauv. (Hedwigiaceae)
ciliata (Hedw.) P. Beauv.
 var. *ciliata*
 var. *leucophaea* B., S. & G.
 var. *viridis* B., S. & G.
integrifolia P. Beauv.
- Hamatocaulis* Hedenäs (Amblystegiaceae) (39)
vernicosus (Mitt.) Hedenäs
- Herzogiella* Broth. (Hypnaceae)
seligeri (Brid.) Iwats.
striatella (Brid.) Iwats.
- Heterocladium* B., S. & G. (Pterigynandraceae)
dimorphum (Brid.) B., S. & G.
heteropterum B., S. & G.
wulfsbergii Hag.
- Homalia* (Brid.) B., S. & G. (Neckeraceae)
besseri Lob. (40)
lusitanica Schimp.
trichomanoides (Hedw.) B., S. & G.
- Homalothecium* B., S. & G. (Brachytheciaceae)
aureum (Spruce) Robins.
lutescens (Hedw.) Robins.
 var. *fallax* Philib. ex Schimp.
 var. *lutescens*
philippianum (Spruce) B., S. & G.
sericeum (Hedw.) B., S. & G.
 var. *mandonii* (Mitt.) Ren. & Card.
 var. *sericeum*
- Homomallium* (Schimp.) Loeske (Hypnaceae)
incurvatum (Brid.) Loeske
- Gymnostomum* Nees & Hornsch. (Pottiaceae)
aeruginosum Sm.
- Hookeria* Sm. (Hookeriaceae)
lucens (Hedw.) Sm.

| | |
|---|--|
| Hydrogrimmia (I. Hag.) Loeske (Grimmiaceae) | vaucheri Lesq. var. <i>coelophyllum</i> (Mol.) Pfeff. var. <i>vaucheri</i> |
| mollis (B., S. & G.) Loeske | |
| Hygrohypnum Lindb. (Amblystegiaceae) | Isopterygiopsis Iwats. (Hypnaceae) |
| <i>cochlearifolium</i> (Vent.) Broth. | muelleriana (Schimp.) Iwats. |
| <i>duriusculum</i> (De Not.) Jamieson | <i>pulchella</i> (Hedw.) Iwats. (43) |
| <i>eugyrium</i> (Schimp.) Broth. | |
| <i>juridum</i> (Hedw.) Jenn. | Isopterygium Mitt. (Hypnaceae) (43) |
| <i>molle</i> (Hedw.) Loeske | <i>elegans</i> (Brid.) Lindb. |
| <i>ochraceum</i> (Turn. ex Wils.) Loeske | (<i>Pseudotaxiphylum elegans</i>) |
| <i>polare</i> (Lindb.) Loeske | <i>pulchellum</i> (Hedw.) Jaeg. |
| <i>smithii</i> (Sw.) Broth. | (<i>Isopterygiopsis pulchella</i>) |
| Hylocomium B., S. & G. (Hylocomiaceac) | Isothecium Brid. (Brachytheciaceae) |
| <i>brevirostre</i> (Brid.) B., S. & G. | <i>algarvacum</i> Nicholson & Dix. |
| <i>pyrenaicum</i> (Spruce) Lindb. | <i>alopecuroides</i> (Dubois) Isov. |
| <i>splendens</i> (Hedw.) B., S. & G. | <i>holtii</i> Kindb. |
| <i>umbratum</i> (Hedw.) B., S. & G. | <i>myosuroides</i> Brid. |
| Hymenostylium Brid. (Pottiaceae) | var. <i>brachytecoides</i> (Dix.) Braithw. (44) |
| <i>insigne</i> (Dix.) Podp. (41) | var. <i>myosuroides</i> |
| <i>recurvirostrum</i> (Hedw.) Dix. | |
| Hyocomium B., S. & G. (Hypnaceae) | Kiacria I. Hag. (Dicranaceae) |
| <i>armoricum</i> (Brid.) Wijk & Marg. | <i>falcata</i> (Hedw.) I. Hag. |
| Hypnum Hedw. (Hypnaceae) | <i>starkei</i> (Web. & Mohr) I. Hag. |
| <i>callichroum</i> Brid. | |
| <i>cupressiforme</i> Hedw. | Kindbergia Ochyra |
| var. <i>brevisetum</i> Schimp. | <i>praelonga</i> (Hedw.) Ochyra |
| var. <i>cupressiforme</i> | (<i>Eurhynchium praelongum</i>) (45) |
| var. <i>filiforme</i> Brid. | var. <i>praelonga</i> |
| var. <i>imbricatum</i> Boul. | var. <i>stokesii</i> (Turn.) Ochyra |
| var. <i>lacunosum</i> Brid. | (<i>Eurhynchium praelongum</i> var. <i>stokesii</i>) |
| var. <i>resupinatum</i> Schimp. | |
| var. <i>subjulaceum</i> Mol. | Lepidopilum (Brid.) Brid. (Callicostaceae) (74) |
| var. <i>uncinatum</i> Boul. (42) | <i>virens</i> Card. |
| (Hypnum cupressiforme var. <i>cupressiforme</i>) | (<i>Tetrastichium virens</i>) |
| var. <i>uncinulatum</i> B., S. & G. (42) | |
| (Hypnum cupressiforme var. <i>cupressiforme</i>) | Leptobarbula Schimp. (Pottiaceae) |
| hamulosum B., S. & G. | <i>berica</i> (De Not.) Schimp. |
| imponens Hedw. | |
| jutlandicum Holmen & Warncke | Leptobryum Wils. (Bryaceae) |
| lindbergii Mitt. | <i>pyriforme</i> (Hedw.) Wils. |
| mamillatum (Brid.) Loeske | |
| pallescens (Hedw.) P. Beauv. | Leptodon Mohr (Leptodontaceae) |
| var. <i>pallescens</i> | <i>smithii</i> (Hedw.) Web. & Mohr |
| var. <i>reptile</i> (Michx.) Husn. | |
| recurvatum (Lindb. & H. Arn.) Kindb. | Lescuraea B., S. & G. (Leskeaceae) |
| revolutum (Mitt.) Lindb. | <i>incurvata</i> (Hedw.) Lawt. |
| | (<i>Pseudoleskea incurvata</i>) |
| | <i>mutabilis</i> (Brid.) Lindb. ex I. Hag. |
| | <i>patens</i> (Lindb.) H. Arn. & C. Jens |
| | (<i>Pseudoleskea patens</i>) |

- plicata* (Web. & Mohr) Broth.
 (*Ptychodium plicatum*)
radicosa (Mitt.) Müll.
 (*Pseudeoleskea radicosa*)
saxicola (B., S. & G.) Milde
- Leskeia* Hedw. (Leskeaceae)
 polycarpa Hedw.
- Leucobryum* Hampe (Leucobryaceae)
 glaucum (Hedw.) Ångstr.
 juniperoides (Brid.) C. Müll.
- Leucodon* Schwaegr. (Leucodontaceae)
 sciuroides (Hedw.) Schwaegr.
 var. *morensis* (Schwaegr.) De Not.
 var. *sciuroides*
- Limprichtia* Loeske (7)
 revolvens (Sw.) Loeske
 cossonii (Schimp.) Anderson, Crum &
 Buch
- Meesia* Hedw. (Meesiaceae)
 triquestra (Richter) Ångstr. (89)
 uliginosa Hedw.
- Metaneckera* Steere (Neckeraceae)
 menziesii (Hook.) Steere
- Mielichhoferia* Hornsch. (Bryaceae)
 elongata (Hope & Hornsch. ex Hook.)
 Hornsch. (46)
 mielichhoferiana (Funck) Loeske
 pontevedrensis Luis.
 (*Schizymenium pontevedrensis*)
- Mnium* Hedw. (Mniaceae)
 ambiguum H. Müll.
 hornum Hedw.
 marginatum (Dicks.) P. Beauv.
 var. *marginatum*
 var. *riparium* (Mitt.) Husn.
 spinosum (Voit.) Schwaegr.
 spinulosum B., S. & G.
 stellare Hedw.
 thomsonii Schimp.
- Myurella* B., S. & G. (Pterigynandraceae)
 juracea (Schwaegr.) B., S. & G.
 var. *juracea*
 var. *scabrifolia* Limpr.
- Neckera* Hedw. (Neckeraceae)
 besserii (Lob.) Jur.
 (*Homalia besserii*)
 cephalonica Jur. & Ung.
 complanata (Hedw.) Hüb.
 crispa Hedw.
 var. *crispa*
 var. *falcata* C. Müll.
 intermedia Brid.
 var. *laevifolia* (Schiffn.) Ren. & Card.
 pennata Hedw.
 pumila Hedw.
 var. *pilifera* Jur.
 var. *pumila*
- Octodiceras* Brid. (Fissidentaceae)
 fontanum (B. Pyl.) Lindb.
- Oedipodiella* Dix. (Gigaspermaceae)
 australis (Wager & Dix.) Dix.
 var. *catalaunica* P. de la Varde
- Oligotrichum* Lam. & DC. (Polytrichaceae)
 hercynicum (Hedw.) Lam. & DC.
- Oncophorus* (Brid.) Brid. (Dicranaceae)
 virens (Hedw.) Brid.
 wahlenbergii Brid. (15)
- Orthodontium* Schwaegr. (Bryaceae)
 pellucens (Hook.) B., S. & G.
- Orthothecium* B., S. & G. (Hypnaceae)
 durieui (Mont.) Besch.
 (*Rhynchostegiella durieui*)
 intricatum (Hartm.) B., S. & G.
 rufescens (Brid.) B., S. & G.
 var. *rufescens*
 var. *virescens* Breidl.
- Orthotrichum* Hedw. (Orthotrichaceae)
 acuminatum Philib. (47)
 affine Brid.
 var. *affine*
 var. *fastigiatum* (Brid.) Hüb.
 var. *neglectum* (Vent.) Vent.
 alpestre Hornsch. ex B., S. & G. (48)
 anomalum Hedw.
 var. *anomalum*
 var. *saxatile* (Brid.) Milde
 australe Jur. (89)
 cupulatum Brid.
 var. *cupulatum*

- var. baldaccii (Bott. & Vent.) Piccioli
 var. bistratosum Schiffn.
 var. nudum (Dicks.) Braithw.
 var. riparium Hüb.
 var. sardagnanum (Vent.) Vent.
diaphanum Brid.
llyllii Hook. & Tayl.
obtusifolium Brid.
pallens Bruch ex Brid.
patens Bruch. ex Brid.
pulchellum Brunt.
pumilum Sw.
rivulare Turn.
rogeri Brid.
 var. *defluens* (Vent.) Vent.
 var. *rogeri*
rupestre Schleich. ex Schwaegr.
 var. *aetnense* (De Not.) Vent.
 var. *franzonianum* (De Not.) Vent.
 var. *ibericum* Vent.
 var. *nudum* (Fleisch. & Warnst.) Podp.
 var. *rupestre*
 var. *sturmii* (Hoppe & Hornsch.) Jur.
speciosum Nees
stellatum Brid.
stramineum Hornsch. ex Brid.
striatum Hedw.
tenellum Bruch ex Brid.
urnigerum Myr.
- Oxystegus* (Limpr.) Hilp. (Pottiaceae)
tenuirostris (Hook. & Tayl.) A. J. E. Sm.
- Palustriella* Ochyra (Helodiaceae) (19)
commutata (Hedw.) Ochyra
 var. *commutata*
 var. *falcata* (Brid.) Ochyra
 var. *fluctuans* (B., S & G.) Ochyra
 var. *sulcata* (Lindb.) Ochyra
decipiens (De Not.) Ochyra
- Paraleucobryum* (Limpr.) Loeske (Dicranaceae)
enerve (Thed.) Loeske
longifolium (Hedw.) Loeske
sauteri (B., S. & G.) Loeske
- Phascum* Hedw. (Pottiaceae) (49)
curvicolle Hedw.
cuspidatum Hedw.
 var. *cuspidatum*
 var. *mitraeforme* Limpr.
 var. *piliferum* (Hedw.) Hook. & Tayl.
 var. *retortifolium* Guerra, Jiménez & Ros
- cuynettii* Biz. & Pierr.
floerkeanum Web. & Mohr
longipes Guerra, Martínez & Ros (50)
piptocarpum Dur. et Mont.
vlassovii Laz. (51)
- Philonotis* Brid. (Bartramiaceae)
arnellii Husn.
caespitosa Jur.
calcarea (B. & S.) Schimp.
fontana (Hedw.) Brid.
hastata (Duby) Wijk & Marg.
marchica (Hedw.) Brid.
 var. *laxa* Loeske & Warnst.
 var. *marchica*
rigida Brid.
seriata Mitt.
tomentella Mol.
- Physcomitrella* B., S. & G. (Funariaceae)
patens (Hedw.) B., S. & G.
 (Aphanorhagma patens)
- Physcomitrium* (Brid.) Brid. (Funariaceae)
pyriforme (Hedw.) Brid.
sphaericum (Hedw.) Brid.
- Plagiobryum* Lindb. (Bryaceae)
zierii (Hedw.) Lindb.
- Plagiomnium* T. Kop. (Mniaceae)
affine (Bland.) T. Kop.
cuspidatum (Hedw.) T. Kop.
elatum (B. & S.) T. Kop.
ellipticum (Brid.) T. Kop.
medium (B. & S.) T. Kop.
rostratum (Schrad.) T. Kop.
undulatum (Hedw.) T. Kop.
- Plagiopus* Brid. (Bartramiaceae)
oederiana (Sw.) Crum & Anderson
- Plagiothecium* B., S. & G. (Plagiotheciaceae)
cavifolium (Brid.) Iwats.
curvifolium Schlieph. ex Limpr.
denticulatum (Hedw.) B., S. & G.
 var. *denticulatum*
 var. *obtusifolium* (Turn.) Moore
laetum B., S. & G.
nemorale (Mitt.) Jaeg.
 var. *neglectum* Mönk.
 var. *nemorale*
 var. *nervosum* Ren.

- piliferum (Sw. ex Hartm.) B., S. & G.
 platyphyllum Mönk.
 ruthei Limpr.
 succulentum (Wils.) Lindb.
 undulatum (Hedw.) B., S. & G.
- Platydictya Berk. (Hypnaceae)
 jungermannioides (Brid.) Crum (52)
- Pleuridium Rabenh. (Ditrichaceae)
 acuminatum Lindb.
 palustre (B. & S.) B., S. & G.
 serrulatum Luis. (89)
 subulatum (Hedw.) Rabenh.
- Pleurochaete Lindb. (Pottiaceae)
 squarrosa (Brid.) Lindb.
 var. brevifolia Thér. & Trab. (53)
 var. squarrosa
- Pleurozium Mitt. (Hylocomiaceae)
 schreberi (Brid.) Mitt.
- Pogonatum P. Beauv. (Polytrichaceae)
 aloides (Hedw.) P. Beauv.
 var. aloides
 var. minimum (Crome) Mol.
 nanum (Hedw.) P. Beauv.
 var. longisetum Schimp..
 var. nanum
 urnigerum (Hedw.) P. Beauv.
- Pohlia Hedw. (Bryaceae)
 andalusica (Höhn.) Broth. (54)
 atropurpurea (Wahlenb.) Lindb.
 campotrichela (Ren. & Card.) Broth.
 cruda (Hedw.) Lindb.
delicatula (Hedw.) Grout.
 (Pohlia melanodon)
 drummondii (C. Müll.) Andr.
 elongata Hedw.
 var. elongata
 ssp. acuminata (Hoppe & Hornsch.)
 Wijk & Marg.
 ssp. polymorpha (Hoppe & Hornsch.)
 Nyh.
 lescuriana (Sull.) Grout
 longicollis (Hedw.) Lindb.
 ludwigii (Spreng. ex Schwaegr.) Broth.
 melanodon (Brid.) Shaw (55)
 nutans (Hedw.) Lindb.
 obtusifolia (Brid.) L. Koch
- prolifera (Lindb. ex Breidl.) Lindb. ex H. Arn.
 wahlenbergii (Web. & Mohr.) Andr.
- Polytrichum Hedw. (Polytrichaceae)
 alpinum Hedw.
 var. alpinum
 var. septentrionale (Sw.) Brid.
 commune Hedw.
 var. commune
 var. humile Sw.
 var. perigoniale (Michx.) Hampe
 formosum Hedw.
 juniperinum Hedw.
 longisetum Sw. ex Brid.
 piliferum Hedw.
 sexangulare Hedw.
 strictum Brid.
- Pottia (Reichenb.) Fürnr. (Pottiaceae)
 bryoides (Dicks.) Mitt.
 caespitosa (Bruch ex Brid.) C. Müll.
 commutata Limpr.
 crinita Wils. ex B., S. & G.
 davalliana (Sm.) C. Jens.
 var. brachyoda (C. Müll.) Chamb.
 var. conica (Schleich. ex Schwaegr.) Chamb.
 var. davalliana
 intermedia (Turn.) Fürnr.
 lanceolata (Hedw.) C. Müll.
 var. lanceolata
 var. leucodonta Schimp.
 pallida Lindb. (56)
 recta (With.) Mitt.
 starkeana (Hedw.) C. Müll.
 truncata (Hedw.) B. & S.
 var. littoralis (Mitt.) Warnst.
 var. truncata
 wilsonii (Hook.) B. & S.
- Pseudephemerum (Lindb.) I. Hag. (Dicranaceae)
 nitidum (Hedw.) Reim.
- Pseudocrossidium Williams (Pottiaceae)
 hornschuchianum (K.F. Schultz) Zander
 revolutum (Brid.) Zander
- Psudoleske B., S. & G. (Leskeaceae) (57)
 incurvata (Hedw.) Loeske
 patens (Lindb.) Kindb.
 radicosa (Mitt.) Macoun & Kindb.

- Pseudoleskeella Kindb. (Leskeaceae)
catenulata (Schrad.) Kindb.
nervosa (Brid.) Nyh.
 var. *nervosa*
 var. *rupestris* (Berggr.) Müll
tectorum (Brid.) Kindb. ex Broth.
- Pseudotaxiphyllum Iwats. (Hypnaceae)
elegans (Brid.) Iwats. (43)
- Pterigynandrum Hedw. (Pterigynandraceae)
filiforme Hedw.
 var. *filescens* Boul.
 var. *filiformis*
 var. *majus* (De Not.) De Not.
- Pterogonium Sw. (Anomodontaceae)
gracile (Hedw.) Sm.
- Pterygoneurum Jur. (Pottiaceae)
lamellatum (Lindb.) Jur.
ovatum (Hedw.) Dix.
 var. *incanum* Jur.
 var. *ovatum*
sampaianum (Mach.) Mach. (59)
subsessile (Brid.) Jur.
- Ptilium De Not. (Hypnaceae)
crista-castrensis (Hedw.) De Not.
- Ptychodium Schimp (Leskeaceae)
plicatum (Web. & Mohr) Schimp.
- Ptychomitrium Fürnr. (Ptychomitriaceae)
incurvum (Schwaegr.) Spruce
polyphyllum (Sw.) B. & S.
- Pylaisia Schimp. (Hypnaceae)
polyantha (Hedw.) Schimp.
- Pyramidula Brid. (Funariaceae)
algeriensis Chudeau & Douin
- Racomitrium Brid. (Grimmiaceae)
aciculare (Hedw.) Brid.
affine (Schleich. ex Web. & Mohr) Lindb.
aquaticum (Schrad.) Brid.
canescens (Hedw.) Brid.
elongatum Frisvoll (60)
fasciculare (Hedw.) Brid.
heterostichum (Hedw.) Brid.
lamprocarpum (C. Müll.) Jaeg. (61)
lanuginosum (Hedw.) Brid.
- macounii Kindb. (62)
 ssp. *alpinum* (Lawt.) Frisvoll
 ssp. *macounii*
obtusum (Brid.) Brid. (63)
sudeticum (Funck) B. & S.
- Rhabdoweisia B., S. & G. (Dicranaceae)
crenulata (Mitt.) Jameson (64)
fugax (Hedw.) B., S. & G.
- Rhizomnium T. Kop. (Mniaceae)
pseudopunctatum (B. & S.) T. Kop.
punctatum (Hedw.) T. Kop.
- Rhodobryum (Schimp.) Limpr. (Bryaceae) (65)
roseum (Hedw.) Limpr.
ontariense (Kindb.) Kindb.
- Rhynchostegiella (B., S & G.) Limpr.
(Brachytheciaceae) (66)
curviseta (Brid.) Limpr.
 var. *curviseta*
 var. *laeviseta* (Nicholson & Dix.) Podp.
durieui (Mont.) Allorge & Perss.
letourneuxii (Besch.) Broth.
 (Rhynchostegiella *curviseta* var. *laeviseta*)
surrecta (Mitt.) Broth.
 (Rhynchostegium *surrectum*)
teesdalei (B., & S.) Limpr.
tenella (Dicks.) Limpr.
 var. *litorea* (De Not.) Mönk.
 var. *meridionalis* Brizi
 var. *tenella*
tenuicaulis (Spruce.) Kartt. (18)
- Rhynchostegium B., S. & G. (Brachytheciaceae)
alopecuroides (Brid.) A.J.E. Sm.
confertum (Dicks.) B., S. & G.
 var. *confertum*
 var. *hercynicum* (Milde) Jaeg.
megalopolitanum (Web. & Mohr) B., S. & G.
 var. *megalopolitanum*
 var. *meridionale* Schimp.
murale (Hedw.) B., S. & G.
riparioides (Hedw.) Card.
rotundifolium (Brid.) B., S. & G.
surrectum (Mitt.) Jaeg. (66)
- Rhytidadelphus (Limpr.) Warnst. (Hylocomiaceae)
loreus (Hedw.) Warnst.
squarrosus (Hedw.) Warnst.
triquetrus (Hedw.) Warnst.

- Rhytidium (Sull.) Kindb. (Rhytidaceae)
rugosum (Hedw.) Kindb.
- Saelania Lindb. (Ditrichaceae)
glaucescens (Hedw.) Broth.
- Sanionia Loeske (Amblystegiaceae) (67)
uncinata (Hedw.) Loeske
- Schistidium Brid. (Grimmiaceae) (68)
agassizii Sull. & Lesq.
apocarpum (Hedw.) B., S. & G.
atrofuscum (Schimp.) Limpr.
brunnescens Limpr.
confertum (Funck.) B. & S.
crassipilum Blom
elegantulum Blom
 ssp. wilsonii Blom
flaccidum (De Not.) Ochyra
papillosum Culm. in Amann
pruininosum (Wils ex Schimp.) Roth.
rivulare (Brid.) Podp.
robustum (Nees & Hornsch.) Blom.
singarensis (Schimp.) Laz.
- Schistostega Mohr (Schistostegaceae)
pennata (Hedw.) Web. & Mohr
- Schizymenium (Bryaceae) (69)
pontovedrensis (Luis.) Sérgio, Casas, Cros & Brugués
- Scleropodium B., S. & G. (Brachytheciaceae)
cespitosum (C. Müll.) L. Koch.
purum (Hedw.) Limpr.
touretii (Brid.) L. Koch.
- Scopelophila (Mitt.) Lindb. (Pottiaceae)
cataractae (Mitt.) Broth. (70)
ligulata (Spruce) Spruce
- Scorpidium (Schimp.) Limpr. (Amblystegiaceae)
scorpioides (Hedw.) Limpr.
- Scorpiurium Schimp. (Brachytheciaceae)
circinatum (Brid.) Fleisch. & Loeske
deflexifolium (Solms) Fleisch. & Loeske
sendtneri (Schimp.) Fleisch.
- Seligeria B., S. & G. (Seligeriaceae) (71)
acutifolia Lindb.
alpestris Schauer
 (*Seligeria patula*)
- calcarea (Hedw.) B., S & G.
donniana (Sm.) C. Müll.
patula (Lindb.) Broth. (33)
pusilla (Hedw.) B., S. & G.
recurvata (Hedw.) B., S. & G.
trifaria (Brid.) Lindb.
- Sematophyllum Mitt. (Sematophyllaceae)
bottinii (Breidl.) Podp.
demissum (Wils.) Mitt.
substrumulosum (Hampe) Brid.
- Sphagnum L. (Sphagnaceae) (72)
angustifolium (Russ. ex Russ.) C. Jens.
centrale C. Jens.
compactum Lam. & DC.
contortum K. F. Schultz
cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
denticulatum Brid.
fallax (Klinggr.) Klinggr.
fimbriatum Wils.
flexuosum Dozy & Molk.
fuscum (Schimp.) Klinggr.
girgensohnii Russ.
magellanicum Brid.
molle Sull.
nemoreum Scop.
 var. schimperi Warnst.
palustre L.
papillosum Lindb.
platyphyllum (Braithw.) Warnst.
pylaesii Brid.
 var. prostratum (Brid.) Card.
quinquefarium (Kindb. ex Braithw.)
Warnst.
rubellum Wils.
russowii Warnst.
squarrosum Crome
subnitens Russ. & Warnst.
subsecundum Nees
tenellum (Brid.) Perss. ex Brid.
teres (Schimp.) Angstr.
warnstorffii Russ.
- Splachnum Hedw. (Splachnaceae)
ampullaceum Hedw.
- Stegonia Vent. (Pottiaceae)
latifolia (Schwaegr.) Vent. ex Broth.
- Taxiphyllum Fleisch. (Hypnaceae)
wissgrillii (Garov.) Wijk & Marg.

- Tayloria Hook. (Splachnaceae)
froehlichiana (Hedw.) Mitt. ex Broth.
tenuis (Dicks.) Schimp. (73)
- Tetraphis Hedw. (Tetraphidaceae)
pellucida Hedw.
- Tetrastichium (Mitt.) Card. (Leucomiaceae) (74)
virens (Card.) Churchill
- Tetrodontium Schwaegr. (Tetraphidaceae)
brownianum (Dicks.) Schwaegr. (75)
- Thamnobryum Nieuwl. (Thamnobryaceae)
alopecurum (Hedw.) Gang.
- Thuidium B., S. & G. (Thuidiaceae)
abietinum (Hedw.) B., S. & G.
var. *abietinum*
var. *hystricosum* (Mitt.) Loeske
delicatulum (Hedw.) Mitt.
philibertiae Limpr.
recognitum (Hedw.) Lindb.
tamariscinum (Hedw.) B., S. & G.
- Timmia Hedw. (Timmiaceae)
austriaca Hedw.
bavarica Hessl.
megalopitana Hedw.
norvegica Zett.
- Timmiella (De Not.) Limpr. (Pottiaceae)
anomala (B. & S.) Limpr.
barbuloides (Brid.) Mäk.
flexiseta (Bruch) Limpr. (76)
- Tomentypnum Loeske (Brachytheciaceae)
nitens (Hedw.) Loeske
- Tortella (Lindb.) Limpr. (Pottiaceae)
densa (Lor. & Mol.) Crundw. & Nyh.
flavovirens (Bruch) Broth.
var. *flavovirens*
var. *minor* Lindb.
var. *papillosissima* Sérgio & Casas (77)
- fragilis (Drumm.) Limpr.
humilis (Hedw.) Jenn.
inclinata (Hedw. f.) Limpr.
inflexa (Bruch) Broth.
nitida (Lindb.) Broth.
tortuosa (Hedw.) Limpr.
- Tortula Hedw. (Pottiaceae)
abranchesii Luis.
atrovirens (Sm.) Lindb.
brevissima Schiffn.
calcicolens Kramer
canescens Mont.
caninervis (Mitt.) Broth.
ssp. *caninervis*
ssp. *spuria* (Amann) Kramer
var. *spuria*
cuneifolia (Dicks.) Turn.
fragilis Tayl. (78)
freibergii Dix. & Loeske (79)
inermis (Brid.) Mont.
intermedia (Brid.) De Not.
var. *calva* (Dur. & Sag.) Wijk & Marg.
var. *intermedia*
laevipila (Brid.) Schwaegr.
var. *laevipila*
var. *meridionalis* (Schimp.) Wijk. & Marg.
latifolia Bruch ex Hartm.
marginata (B. & S.) Spruce
var. *limbata* (Lindb.) Podp.
var. *marginata*
mucronifolia Schwaegr.
muralis Hedw.
var. *aestiva* Brid. ex Hedw.
var. *baetica* Casas & Oliva
var. *incana* B., S. & G.
var. *muralis*
var. *obcordata* Schimp.
var. *rupestris* K.F. Schultz
norvegica (Web.) Wahlenb. ex Lindb.
obtusifolia (Schwaegr.) Math.
pagorum (Milde) De Not.
papillosa Wils.
princeps De Not.
revolvens (Schimp.) G. Roth
var. *obtusata* Reim.
var. *revolvens*
rhizophylla (Sak.) Iwats. & Saito
(Chenia *rhizophylla*)
ruraliformis (Besch.) Grout
var. *ruraliformis*
var. *subpapillosissima* (Biz. & Pierr.)
Kramer
ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb.
var. *hirsuta* (Vent.) Par.
var. *ruralis*
sinensis (C. Müll.) Broth. (78)
solmsii (Schimp.) Limpr.
subulata Hedw.
var. *angustata* (Schimp.) Limpr.

| | |
|---|---|
| var. <i>graeffii</i> Warnst. | <i>hutchinsiae</i> (Sm.) Hammar |
| var. <i>subinermis</i> (B., S. & G.) Wils. | <i>phyllantha</i> Brid. (82) |
| var. <i>subulata</i> | |
| <i>vahliana</i> (K.F. Schultz) Mont. | <i>Warnstorffia</i> Loeske (Amblystegiaceae) (83) |
| <i>virescens</i> (De Not.) De Not. | <i>exannulata</i> (B., S. & G.) Loeske |
| Trichostomopsis Card. (Pottiaceae) | var. <i>exannulata</i> |
| <i>aaronis</i> (Lor.) Agnew & Townsend (80) | var. <i>purpurascens</i> (Schimp.) Tuom. & |
| <i>trivialis</i> (C. Müll.) Robins. | Kop. |
| <i>umbrosa</i> (C. Müll.) Robins. | <i>fluitans</i> (Hedw.) Loeske |
| Trichostomum Bruch (Pottiaceae) | Weissia Hedw. (Pottiaceae) |
| brachydontium Bruch | <i>brachycarpa</i> (Nees & Hornsch.) Jur. |
| var. <i>brachydontium</i> | <i>condensa</i> (Voit) Lindb. |
| var. <i>cuspidatum</i> (Braithw.) Sav. | <i>controversa</i> Hedw. |
| var. <i>littorale</i> (Mitt.) C. Jens. | <i>fallax</i> Sehlm. |
| var. <i>unguiculatum</i> (Philib.) Corb. & Jah. | <i>levieri</i> (Limpr.) Kindb. |
| crispulum Bruch | <i>longifolia</i> Mitt. |
| var. <i>crispulum</i> | <i>rutilans</i> (Hedw.) Lindb. |
| var. <i>cucullatum</i> (Card.) Biz. | <i>squarrosa</i> (Nees & Hornsch.) C. Müll. |
| var. <i>elatum</i> Schimp. | <i>triumphans</i> (De Not.) M. Hill. |
| Triquetrella C. Müll. (Pottiaceae) | var. <i>monspeliense</i> (Schimp.) Husn. |
| <i>rapilensis</i> Luis. | var. <i>pallidiseta</i> (H. Müll.) Husn. |
| Ulota Mohr (Orthotrichaceae) | var. <i>triumphans</i> |
| <i>bruchii</i> Hornsch. ex Brid. (81) | <i>wimmeriana</i> (Sendtn.) B., S. & G. |
| <i>calvescens</i> Wils. | Zygodon Hook. & Tayl. (Orthotrichaceae) |
| <i>coarctata</i> (P. Beauv.) Hammar | <i>baumgartneri</i> Malta |
| <i>crispa</i> (Hedw.) Brid. | (Zygodon rupestris) |
| var. <i>norvegica</i> (Grönv.) A.J.E. Sm. & M. | <i>conoideus</i> (Dicks.) Hook. & Tayl. |
| Hill | <i>försteri</i> (Dicks.) Mitt. |
| (<i>Ulota bruchii</i>) | <i>rupestris</i> Schimp. ex Lor. |
| | <i>viridissimus</i> (Dicks.) Brid. |

Systematic arrangement of genera

Class Musci

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Subclass Sphagnidae | Order Seligeriales |
| Order Sphagnales | Seligeriaceae Schimp. |
| Sphagnaceae Dum. | Brachydontium Fürnr. |
| <i>Sphagnum</i> L. | Seligeria B., S. & G. |
| <i>Blindia</i> B., S. & G. | |
| Subclass Andreaeidae | Order Buxbaumiales |
| Order Andreaeales | Buxbaumiaceae Schwaegr. in Willd. |
| Andreaeaceae Dum. | <i>Buxbaumia</i> Hedw. |
| <i>Andreaea</i> Hedw. | <i>Diphyscium</i> Mohr |
| Subclass Bryidae | Order Pottiales |
| Order Archidiales | Encalyptaceae Schimp. |
| Archidiaceae Schimp. | <i>Encalypta</i> Hedw. |
| <i>Archidium</i> Brid. | Pottiaceae Schimp. |
| <i>Astomum</i> Hampe | <i>Aschisma</i> Lindb. |
| Order Dicranales | <i>Weissia</i> Hedw. |
| Ditrichaceae Limpr. in Rabenh. | <i>Gymnostomum</i> Nees & Hornsch. |
| <i>Pleuridium</i> Rabenh. | <i>Hymenostylium</i> Brid. |
| <i>Ditrichum</i> Hampe | <i>Gyroweisia</i> Schimp. |
| <i>Cheilotrichia</i> Lindb. | <i>Eucladium</i> B., S. & G. |
| <i>Ceratodon</i> Brid. | <i>Oxystegus</i> (Limpr.) Hilp. |
| <i>Saelania</i> Lind. | <i>Trichostomum</i> Bruch |
| <i>Distichium</i> B., S. & G. | <i>Timmiella</i> (De Not.) Limpr. |
| Bruchiaceae Schimp. | <i>Tortella</i> (Lindb.) Limpr. |
| <i>Bruchia</i> Schwaegr. | <i>Pleurochaete</i> Lindb. |
| Dicranaceae Schimp. | <i>Trichostomopsis</i> Card. |
| <i>Pseudephemerum</i> (Lindb.) Loeske | <i>Triquetrella</i> C. Müll. |
| <i>Dicranella</i> (C. Müll.) Schimp. | <i>Didymodon</i> Hedw. |
| <i>Rhabdoweisia</i> B., S. & G. | <i>Bryoerythrophyllum</i> Chen |
| <i>Oncophorus</i> (Brid.) Brid. | <i>Leptobarbula</i> Schimp. |
| <i>Cynodontium</i> Schimp. | <i>Barbula</i> Hedw. |
| <i>Dichodontium</i> Schimp. | <i>Pseudocrossidium</i> Williams |
| <i>Dicranoweisia</i> Lindb. ex Milde | <i>Anoectangium</i> Schwaegr. |
| <i>Arctoa</i> B., S. & G. | <i>Scopelophila</i> (Mitt.) Lindb. |
| <i>Kiaeria</i> Hag. | <i>Acaulon</i> C. Müll. |
| <i>Dicranum</i> Hedw. | <i>Stegonia</i> Vent. |
| <i>Campylopus</i> Brid. | <i>Pterygoneurum</i> Jur. |
| <i>Dicranodontium</i> B., S. & G. | <i>Crossidium</i> Jur. |
| <i>Paraleucobryum</i> (Lindb.) Loeske | <i>Aloina</i> Kindb. |
| Leucobryaceae Schimp. | <i>Phascum</i> Hedw. |
| <i>Leucobryum</i> Hampe | <i>Pottia</i> (Reichend.) Fürnr. |
| Order Fissidentales | <i>Desmatodon</i> Brid. |
| Fissidentaceae Schimp. | <i>Chenia</i> Zander |
| <i>Fissidens</i> Hedw. | <i>Tortula</i> Hedw. |
| <i>Octodiceras</i> Brid. | <i>Cinclidotus</i> P. Beauv. |

- Order Grimmiales
 Grimmiaceae Arnott
Hydrogrimmia (I. Hag.) Loeske
Grimmia Hedw.
Schistidium Brid.
Coscinodon Spreng.
Dryptodon Brid.
Racomitrium Brid.
Ptychomitriaceae Schimp.
Campylostelium B., S. & G.
Ptychomitrium Fürnr.
- Order Funariales
Gigaspermaceae Lindb.
Gigaspermum Lindb.
Oedipodiella Dix.
Ephemeraceae Schimp.
Ephemerum Hampe.
Funariaceae Schwaegr. in Willd.
Aphanorhegma Sull.
Physcomitrium (Brid.) Brid.
Pyramidula Brid.
Goniomitrium Hook. f. & Wils.
Funaria Hedw.
Entosthodon Schwaegr.
Funariella Sérgio
Splachnaceae Grev. & Arnott
Tayloria Hook.
Splachnum Hedw.
- Order Schistostegales
Schistostegaceae Schimp.
Schistostega Mohr
- Order Bryales
Bryaceae Schwaegr. in Willd.
Orthodontium Schwaegr.
Mielichhoferia Hornsch.
Schizymenium Harv.
Pohlia Hedw.
Anomobryum Schimp.
Epipterygium Lindb.
Plagiobryum Lindb.
Leptobryum Wils.
Bryum Hedw.
Rhodobryum (Schimp.) Limpr.
Mniaceae Schwaegr. in Willd.
Mnium Hedw.
Rhizomnium T. Kop.
Plagiomnium T. Kop.
Aulacomniaceae Schimp.
Aulacomnium Schwaegr.
- Meesiaceae* Schimp.
Amblyodon B., S. & G.
Meesia Hedw.
Catosciaceae Boul. ex Broth.
Catascopium Brid.
Bartramiaceae Schwaegr. in Willd.
Plagiopus Brid.
Breutelia Schimp.
Anacolia Schimp.
Bartramia Hedw.
Conostomum Sw.
Philonotis Brid.
Timmiaceae Schimp.
Timmia Hedw.
- Order Orthotrichales
Orthotrichaceae Arnott
Zygodon Hook. & Tayl.
Amphidium Schimp.
Orthotrichum Hedw.
Ulota Mohr
- Order Leucodontales
Fontinalaceae Schimp.
Fontinalis Hedw.
Dichelyma Myr.
Climaciaceae Kindb.
Climacium Web. & Mohr
Anomodontaceae Kindb.
Anomodon Hook. & Tayl.
Pterogonium Sw.
Hedwigiaceae Schimp.
Hedwigia P. Beauv.
Cryphaeaceae Schimp.
Cryphaea Mohr
Leptodontaceae Schimp.
Leptodon Mohr
Leucodontaceae Schimp.
Leucodon Schwaegr.
Antitrichia Brid.
Neckeraceae Schimp.
Neckera Hedw.
Metaneckera Steere
Homalia (Brid.) B., S. & G.
- Order Hookeriales
Hookeriaceae Schimp.
Hookeria Sm.
Callicostaceae Crum
Cyclodictyon Mitt.
Leucomiaceae Broth.
Tetrasporium (Mitt.) Card.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Order Hypnales | Scleropodium B., S. & G. |
| Fabroniaceae Schimp. | Rhynchostegium B., S. & G. |
| Fabronia Raddi | Eurhynchium B., S. & G. |
| Clasmatodon Hook. f. & Wils. | Rhynchostegiella (B., S. & G.) Limpr. |
| Leskeaceae Schimp. | Entodontaceae Kindb. |
| Habrodon Schimp. | Entodon C. Müll. |
| Leskea Hedw. | Plagiotheciaceae (Broth.) Fleisch. |
| Lescuraea B., S. & G. | Plagiothecium B., S. & G. |
| Ptychodium Schimp. | Sematophyllaceae Broth. |
| Pseudoleskea B., S. & G. | Sematophyllum Mitt. |
| Pseudoleskeella Kindb. | Hypnaceae Schimp. |
| Claopodium (Lesq. & James) Ren. & Card. | Orthothecium B., S. & G. |
| Pterigynandraceae Schimp. | Pylaisia Schimp. |
| Pterigynandrum Hedw. | Homomallium (Schimp.) Loeske |
| Myurella B., S. & G. | Platydictya Berk. |
| Heterocladium B., S. & G. | Hypnum Hedw. |
| Thuidiaceae Schimp. | Callicladium Crum |
| Thuidium B., S. & G. | Isopterygiopsis Iwats. |
| Thamnobryaceae Marg. & During | Pseudotaxiphyllum Iwats. |
| Thamnobryum Nieuwl. | Taxiphyllum Fleisch. |
| Amblystegiaceae G. Roth | Herzogiella Broth. |
| Cratoneuron (Sull.) Spruce | Ctenidium (Schimp.) Mitt. |
| Palustriella Ochyra | Ptilium De Not. |
| Campylium (Sull.) Mitt. | Hyocomium B., S. & G. |
| Amblystegium B., S. & G. | Hylocomiaceae (Broth.) Fleisch. |
| Conardia Robins. | Hylocomium B., S. & G. |
| Sanionia Loeske | Rhytidiodelphus (Limpr.) Warnst. |
| Drepanocladus (C. Müll.) G. Roth | Pleurozium Mitt. |
| Hamatocaulis Hedenäs | Rhytidiacaeae Broth. |
| Limprichia Loeske | Rhytidium (Sull.) Kindb. |
| Scorpidium (Schimp.) Limpr. | Order Tetraphidales |
| Warnstorffia Loeske | Tetraphidaceae Schimp. |
| Calliergon (Sull.) Kindb. | Tetrodontium Schwaegr. |
| Hygrohypnum Lindb. | Tetraphis Hedw. |
| Calliergonella Loeske | Order Polytrichales |
| Brachytheciaceae G. Roth | Polytrichaceae Schwaegr. in Willd. |
| Tomentypnum Loeske | Atrichum P. Beauv. |
| Homalothecium B., S. & G. | Oligotrichum Lam. & DC. |
| Scorpiurium Schimp. | Pogonatum P. Beauv. |
| Isothecium Brid. | Polytrichum Hedw. |
| Brachythecium B., S. & G. | |
| Cirriphyllum Grout | |

EXCLUDED TAXA

- Anomodon rugelii (C. Müll.) Keissl. (84)
 Atrichum crispum (James) Sull. & Lesq. (?)
 Funaria microstoma Bruch ex Schimp. (85)
 Heterocladium macounii Best. (86)
 Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. var. ericoides (Hedw.) Hampe (60)
 Sphagnum angermanicum Melin (84)
 Sphagnum pulchrum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. (87)
 Weissia rostellata (Brid.) Lindb. (84)

Acknowledgments

I am very especially grateful to M. Brugués and R.M. Cros for their unconditional help in bringing to an end this checklist. I. Granzow is responsible for the english translation.

I greatly appreciate those valuable comments and the identification of material from a number of species provided by H.H. Blom, M.F.V. Corley, A.A. Frisvoll, R. Gauthier, B. Murray, C. Sérgio and P. Stormer.

Annotations and references

1. Casas, C., Sérgio, C., Cros, R.M. & Brugués, M. 1990. Datos sobre el género *Acaulon* en la Península Ibérica. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 11: 63-70.
2. Brugués, M. & Crum, H. 1984. *Acaulon casasianum*, a new moss from Spain. *Lindbergia* 10: 1-3.
3. Casas, C., Sérgio, C., Cros, R.M. & Brugués, M. 1986. *Acaulon dertosense*, sp. nov., musgo terrícola de los olivares del Baix Ebre (Catalunya). *Anales Jard. Bot. Madrid* 42: 299-301.
4. Casas, C. & Sérgio, C. 1990. *Acaulon fontquierianum* sp. nov. de la Península Ibérica. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 11: 57-62.
5. Sérgio, C. 1972. Os géneros *Aschisma*, *Acaulon* e *Phascum* (Muscipottiaceae) em Portugal. *Bol. Soc. Broteriana* 46: 457-463.
6. The species list for the genus *Andreaea* is based on the identifications provided by B. Murray for the specimens in BCB. «I have not finished my analysis of the *heinemannii* group. I still think there are 3 recognizable taxa: *heinemannii* (= *angustata*), *crassifolia*, and an undescribed taxon. All of these occur in Spain.» B. Murray in litt.
7. Following Ireland, R. R. 1991. Cuticular papillae of *Atrichum crispum*. *Bryologist* 94: 73-76, the record appearing in Miguel, A. de 1986. Novedades para la flora briofítica española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42: 309-317, turns out to be erroneous.
8. Elias, M.J. 1987-1988. Aportaciones al conocimiento de la brioflora centro-occidental española. *Lazaroa* 10: 207-212.
9. Lloret, F. 1987. *Bryoerythrophyllum inaequalifolium* (Tayl.) Zander, new to the European continent. *Lindbergia* 13: 127-129.
10. Guerra, J. & Puche, M.F. 1984. *Bryum dunense* Smith y Whitehouse en la Península Ibérica y Baleares. Observaciones taxonómicas, corológicas y fitosociológicas. *Acta Bot. Malacitana* 9: 85-92.
11. Guerra, J. & Wallace, E.C. 1986. Musgos y hepáticas de Doñana (Huelva, España). *Boletim Sociedade Broteriana* 59: 77-86.
12. Casas, C. & Brugués, M. 1983. Addicions a la brioflora de les comarques taragonines, *Collect. Bot.* 14: 235-241.
13. Wilczek, R. & Demaret, F. 1982. Etude des types de huit espèces du groupe *Bryum capillare* Hedw. *Jard. Bot. Nat. Belg.* 52: 439-462.
14. Lara, F. 1989. Datos sobre la brioflora del melojar de San Ildefonso (Segovia). *Bot. Complutensis* 14: 181-184.
15. Lloret, F. 1989. Briófitos del alto valle del Ter. *Orsis* 4: 11-45.
16. Martínez Lacal, F., Mateo, F.D. & Varo, J. 1989. *Tortula rhizophylla* (Sak.) Iwats. & Saito, musgo nuevo para la Península Ibérica. *Fol. Bot. Misc.* 6: 81-84.

17. New record for Spain, collected in Salamanca: leg. Casas & al. 6.5.1990. BCB.
18. Karttunen, K. 1990. Nomenclatural and taxonomic notes on *Cirriphyllum* (Brachytheciaceae, Bryophyta). *Taxon* 39: 312-322.
19. Ochyra, R. 1989. Animadversions on the moss genus *Cratoneuron* (Sull.) Spruce. *Journ. Hattori Bot. Lab.* 67: 203-242.
20. Ros, R.M. & Guerra, J. 1986. *Crossidium aberrans* Holz. et Bartr. (Musc.) novedad para la flora europea. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol* 7: 71-75. At present, numerous localities are known for calcareous areas in Spain.
21. Casas, C. & Peñuelas, J. 1985. *Dichelyma falcatum* (Hedw.) Myr., a glacial relict new to Southern Europe. *J. Bryol.* 13: 591-592.
22. Brugués, M. 1983. *Dicranella varia* i *Dicranella howei* als Països Catalans. *Lazaroa* 5: 301-303.
23. New record from northern Spain: leg. Stevenson BCB.
24. Corley, M.F.V. & al. (1981) is followed, but K. Saito 1975 (A Monograph of Japanese Pottiaceae. *Journ. Hattori. Bot. Lab.* 39: 373-537) and R.H. Zander 1978 (New combinations in *Didymodon* (Musc.) and a key to the taxa in North America north of Mexico. *Phytologia* 41: 11-32) are also taken into account.
25. New record from the Pyrenees: leg. Canalis 24.8.1986 BCB.
26. New record from Salamanca: leg. Casas & al. 4.6.1990 BCB.
27. Almost half of the specimens of *Ditrichum flexicaule* in spanish herbaria are actually *D. crispissimum*. Frisvoll, A.A. 1985 (Lectotypifications including nomenclatural and taxonomical notes on *Ditrichum flexicaule* sensu lato. *Bryologist* 88: 31-40) has been followed for their identification.
28. Casas, C. & Elias, M.J. 1988. Notas breves. *Ditrichum lineare* (Sw.) Lindb. en la Peña de Francia (Salamanca). *Collect. Bot.* 17: 307-308.
29. Sérgio, C. 1982. Contribuição para o conhecimento do género *Ephemerum* Hampe na Península Ibérica. *Acta Bot. Malacitana* 7: 87-96.
30. Bruggeman-Nannenga, M.A. 1985. The section *Pachylomidium* (genus *Fissidens*). IV. Further species from Europe, the Mediterranean and the Atlantic African Islands. *Proc. K. Ned. Aka. Wet. Ser. C* 88: 183-207.
31. Bruggeman-Nannenga, M.A. 1982. The section *Pachylomidium* (genus *Fissidens*). III. The *F. crassipes* - subcomplex (*F. bryoides*-complex), *F. sublineaefolius* (Pot. Varde) Brugg.-Nann. and *F. fluitans* (Pot. Varde) Brugg.-Nann. *Proc. K. Ned. Akad. Wet. Ser. C* 85: 59-104.
32. Karttunen, K. 1987. *Fissidens dubius*, the correct name for *F. cristatus* (Bryophyta). *Ann. Bot. Fennici* 24: 81-84.
33. Nyholm, E. 1987. Illustrated Flora of Nordic Mosses I. Fissidentaceae-Seligeriaceae. Copenhagen.
34. Sérgio, C. 1988. Morphological, kariological and phytogeographic observations on *Entosthodon curvisetus* (Schwaegr.) C. Müll. as a basis for a new genus, *Funariella* Sérgio (Funariaceae, Musci). *Orsis* 3: 5-13.
35. New record, collected from the Pyrenees: leg. Canalis 8.11.1981 BCB.
36. Sérgio, C. 1984. Estudio taxonómico, ecológico e corológico de *Gymnostomum luisieri* (Sérgio) Sérgio ex Crundw. na Península Ibérica. *Anales Biología* 2: 357-366.
37. Fröhlich, J. 1963. Zwei neue Laubmose aus Nordgriechenland. *Annl. naturh. Mus. Wien*. 66: 35-36.
38. New record, collected from Almería: leg. Guerra & Ros MUB.

39. Hedenäs, L. 1989. The genera *Scorpidium* and *Hamatocaulis*, gen. nov. in Northern Europe. *Lindbergia* 15: 8-36.
40. Frahm, J. P. 1983. The taxonomic status of *Neckera besseri* (Lob.) Jur. and *Homalia webbiana* Mont. *J. Bryol.* 12: 337-341.
41. Casas, C., Cros, R.M., Brugués, M., Sérgio, C. & Sim Sim, M. 1985. Estudi de la brioflora dels Ports de Beséit. *Orsis* 1: 13-31.
42. Ando, H. 1985. *Hypnum cupressiforme* Hedw. and its allies in Europe. *Abstracta Botanica* 9, suppl. 2: 11-18.
43. Iwatsuki, Z. 1987. Notes on *Isopterygium* Mitt. (Plagiotheciaceae). *Journ. Hattori Bot. Lab.* 63: 441-451.
44. Guerra, J. & Llamas, B. 1988. *Isothecium myosuroides* Brid. var. *brachythecioides* (Dix.) Braith. a new addition to the Bryoflora of the Iberian Peninsula. *Lindbergia* 14: 24-26.
45. Ochyra, R. 1982. *Kindbergia* (Brachytheciaceae, Musci) a new name for *Stokesiella* (Kindb.) Robins, nom illeg. *Lindbergia* 8: 53-54.
46. Manobens, R.M. & Casas, C. 1985. *Mielichhoferia elongata* (Musci), espècie nova per a la brioflora ibèrica, i altres aportacions. *Collect. Bot.* 16: 323-326.
47. Mateo, F.D., Zafra, M.L. & Varo, J. 1990. Datos sobre el género *Orthotrichum* Hedw. en la Península Ibérica. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 11: 377-383.
48. Zafra, M.L. 1982. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica de la España peninsular. *Collect. Bot.* 13: 257-264.
49. The species list of genus *Phascum* is the result of the revision of specimens in spanish herbaria carried out by J. Guerra and co-workers.
50. Guerra, J., Martínez, J.J., Ros, R.M. & Carrion, J.S. 1990. *Phascum longipes* sp. nv. on gypsum soils from Almería, Spain. *J. Bryol.* 16: 55-60.
51. Jiménez, M.N., Ros, R.M. & Guerra, J. 1990. *Phascum vlassovii* Laz. (Pottiacées, Musci) en Europa. *Anales. Jard. Bot. Madrid* 47: 234-235.
52. Hedenäs, L. 1987. North European mosses with axillary rhizoids, a taxonomic study. *J. Bryol.* 14: 429-439.
53. Casas, C. & Oliva, R. 1982. Aportación al estudio de la brioflora de las provincias de Córdoba y Sevilla. *Collect. Bot.* 13: 153-161.
54. Shaw, A.J. 1981. A taxonomic revision of the propaguliferous species of *Pohlia* (Musci) in North America. *Journ. Hattori Bot. Lab.* 50: 1-81.
55. Shaw, A.J. 1981. Taxonomic studies on *Pohlia* subg. *Mniobryum* including *P. brevinervis* Lindb. & Arn. new for North America. *Bryologist* 84: 505-514.
56. Guerra, J. & Ros, R.M. 1988. Caracterización taxonómica, corológica y ecológica de *Pottia pallida* Lindb. Relación con otras especies. *Cryptogamie, Bryol., Lichénol.* 9: 343-352.
57. Crum, H. & Anderson, L.E. 1981. Mosses of Eastern North America. Columbia University Press. New York.
58. Fuertes, E. 1987. *Desmatodon heimii* (Hedw.) Mitt. in the Iberian Peninsula. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 8: 147-148.
59. Casas, C. & Brugués, M. 1978. Nova aportació al coneixement de la brioflora dels Monegros. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 35: 103-114.
60. Upon revision of *Racomitrium canescens* and *R. canescens* var. *ericoides* specimens in spanish herbaria, almost half of them were found to be *R. elongatum*. It is confirmed that *R. ericoides* does not occur in Spain.

61. C. Sérgio, pers. comm., as a result of the revision of material from Sierra de Guadarrama (Madrid).
62. Frisvold, A.A. 1988. A taxonomic review of *Racomitrium heterostichum* Group (Bryophyta, Grimmiiales) in N. et C. America, N. Africa, Europa and Asia. Gunneria 59: 1-289.
63. *Racomitrium obtusum* occurs in Galicia, according to J. Muñoz (pers. comm.): leg. Reinoso 5.2.1981 BCB 4903.
64. Ederra, A. 1983. *Rhabdoweisia crenulata* (Mitt.) Jameson, novedad para la flora briológica española. Anales Jard. Bot. Madrid 40: 463.
65. Casas, C. 1985. *Rhodobryum ontariense* (Kindb.) Kindb. a Catalunya. Orsis 1: 3-7.
66. Düll, R. 1986. Revision of *Rhynchostegiella* and closely related taxa in Macaronesia with reference to their occurrence in Europa. Bryol. Beitr. 6: 91-105.
67. Hedenäs, L. 1989. The genus *Sanionia* (Musci) in Northwestern Europa. Ann. Bot. Fennici. 26: 399-419.
68. The species list of *Schistidium* occurring in Spain is based on Blom's verifications of the material of this genus kept in BCB.
69. Sérgio, C., Casas, C., Cros, R.M. & Brugués, M. 1989. *Schizymenium pontedrensis*, una nueva combinación para una especie endémica del género *Mielichhoferia* en la Península Ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid 46: 606-608.
70. New record, collected from Navarra: leg. Schumacker & Brugués 6.2.1988 BCB 26666.
71. Puche, F. 1989. El género *Seligeria* B., S. & G. (Musci) en la Península Ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid 46: 405-412.
72. The list of species in genus *Sphagnum* is the result of the revision of spanish material in BCB herbarium and Bryotheca Iberica carried out by R. Gauthier, 1990.
73. Lloret, F. 1989. Colonización de excrementos de bóvido por *Tayloria tenuis* (With.) Schimp. Anales Jard. Bot. Madrid 46: 469-476.
74. Dirkse, G.M. 1989. The systematic position of *Lepidopilum virens* Card. (Musci). Lindbergia 14: 147-150. Dirkse, G. M. & Churchill, S.P. 1989. Transfer of *Lepidopilum virens* Cardot to *Terrastichium* (Leucomiaceae). J. Bryol. 15: 537-541.
75. Heras, P. 1987. *Tetradonium brownianum* (Dicks.) Schwaegr. en España. Act. VI Simp. Nac. Bot. Cript. 513-516. Universidad de Granada.
76. New record, collected in Salamanca: leg. Casas & al. 4.4.1990 BCB.
77. Sérgio, C. & Casas, C. 1981. *Tortella flavovirens* (Bruch) Broth. var *papillossima* C. Sérgio & C. Casas. Portug. Acta Biol. 13: 114-118.
78. Lloret, F. 1986. *Tortula sinensis* y *Tortula fragilis*, novedades para la brioflora de la Península Ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid 42: 303-308.
79. A specimen has been collected by Pierrot 21.8.1956, in the North of Spain BCB 20392.
80. Guerra, J. & Ros, R.M. 1987. Revisión de la sección *Asteriscium* del género *Didymodon* (Pottiaceae, Musci) (= *Trichostomopsis*) en la Península Ibérica. Cryptogamie, Bryol. Lichénol. 8: 47-68.
81. Rosman-Hartog, N. & Touw, A. 1987. On the taxonomic status of *Ulota bruchii* Horns. ex Brid., *U. crispa* (Hedw.) Brid. and *U. crispula* Bruch. ex Brid. Lindbergia 13: 159-164.

82. Fuertes, E. & Martínez-Conde, E. 1989. Additions to the bryoflora of the Picos de Europa, of Cantabria and the Iberian Peninsula. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 10: 319-324.
83. Tuomikoski, R. & Koponen, T. 1979. On the generic taxonomy of *Calliergon* and *Drepanocladus* (Muscini, Amblystegiaceae). *Ann. Bot. Fennici.* 16: 213-227.
84. Upon revision of all specimens in herbaria, the identification turned out to be erroneous.
85. *Funaria microstoma* Bruch ex Schimp. Upon revision of specimens considered to be *Funaria microstoma*, it was confirmed that they were actually *F. hygrometrica*. The record from the Pyrenees (C. Casas, 1986. *Catálogo de los briófitos de la vertiente española del Pirineo Central y de Andorra. Collect. Bot.* 16: 255-321) is due to an error in the transcription of *Encalypta microstoma* from F. Kern 1915 (*Beiträge zur Moosflora der Pyrenäen. Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur.* 92: 34-40). The taxon is therefore excluded from the list, until its presence in Spain is confirmed.
86. *Heterocladium macounii* Best. All specimens examined which were named as an infraspecific taxon, *H. heteropterum* var. *macounii*, belong to var. *heteropterum*.
87. *Sphagnum pulchrum* (Lindb. ex Braithw.) Warnst. The specimen 70 in *Bryotheca Iberica* was reviewed by R. Gauthier, and belongs to *S. flexuosum* Dozy & Molk. No other specimen for this taxon is known from Spain.
88. Anderson, L.E., Crum, H.A. & Buch, W.R. 1990. List of the mosses of North America North of Mexico. *Bryologist* 93: 448-499.
89. Specimens of this taxon were collected earlier than 1925, but never found again since.