






J. Ullastre

MS 570





J. Ullastre




ÀGER
± 600


LA BARONIA
DE ST. OISME
± 400







Croquis del Montsec d' Estall - Montsec d'Ares visto desde el vértice geodésico Millà, 1027 m. (hoja topográfica 289 Benabarre). Comprende los bocetos geológicos I y II. Los materiales del Paleógeno de la cuenca de Àger - Meià se extienden hacia el W hasta debajo de los conglomerados discordantes de Fet. Entre Mas d'en Gassol y San Bartomeu y entre el Noguera Ribagorçana y Montfalcó el núcleo del anticlinal del Montsec es fácilmente visible sobre el terreno. Al W de Corçà, la sierra de primer término pertenece al flanco meridional del anticlinal; sobre él, localmente, se aplican en discordancia las brechas paleocenas del sinclinal de Àger - Meià. Las margas del Santoniense - límite septentrional de nuestra cartografía - forman un rellano al pie del escarpe superior de la sierra constituido por las calizas del Senoniense superior.



Croquis del Montsec de Rúbies visto desde el vértice geodésico Sant Mamet, 1388 m (hoja topográfica 328 Artesa de Segre). Comprende los bocetos geológicos III y IV. Al pie del Montsec se observa el Paleógeno de la cuenca Àger - Meià, cuyo sinclinal es bien visible al W. En la base del escarpe superior continúa el rellano de margas santonienses. Al E, los conglomerados discordantes de Santa Anna de Montadó en suave pendiente, y el asomo "diapírico" de Montmagastre, en las inmediaciones del río Segre.